

# Бескоалиционные игры

Н.Н. Писарук  
pisaruk@yandex.by

Экономический факультет  
Белорусский государственный университет

Минск - 2014

# Содержание

- 1 Бескоалиционные игры, равновесие Нэша
  - Стратегическая форма бескоалиционной игры
  - Примеры бескоалиционных игр
  - Доминирование
- 2 Выпуклые игры
  - Теорема Нэша
  - Итерационный алгоритм решения выпуклых игр
- 3 Конечные бескоалиционные игры
  - Смешанные стратегии
  - Равновесие в смешанных стратегиях

# Содержание

- 1 Бескоалиционные игры, равновесие Нэша
  - Стратегическая форма бескоалиционной игры
  - Примеры бескоалиционных игр
  - Доминирование
- 2 Выпуклые игры
  - Теорема Нэша
  - Итерационный алгоритм решения выпуклых игр
- 3 Конечные бескоалиционные игры
  - Смешанные стратегии
  - Равновесие в смешанных стратегиях

# Стратегическая форма бескоалиционной игры

- *Бескоалиционной игрой* (в стратегической форме)  $n$  игроков называется тройка

$$\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N}),$$

где

- $N = \{1, \dots, n\}$  есть множество игроков,
- $S_i$  — множество стратегий игрока  $i$ ,
- а  $\phi_i$  — функция выигрышей  $i$ -го игрока.
- Набор стратегий игроков  $s = (s_1, s_2, \dots, s_n)$ ,  $s_i \in S_i$ ,  $i = 1, \dots, n$ , называется *ситуацией* или *партией*.
- Функции  $\phi_i$  выигрышей игроков определены на множестве ситуаций  $S = S_1 \times \dots \times S_n$ .
- Игроки одновременно объявляют свои стратегии  $s_1 \in S_1, \dots, s_n \in S_n$ ,
- и в сложившейся ситуации  $s = (s_1, \dots, s_n)$  игрок  $i$  выигрывает  $\phi_i(s)$ ,  $i = 1, \dots, n$ .

# Стратегическая форма бескоалиционной игры

- *Бескоалиционной игрой* (в стратегической форме)  $n$  игроков называется тройка

$$\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N}),$$

где

- $N = \{1, \dots, n\}$  — **есть множество игроков**,
- $S_i$  — множество стратегий игрока  $i$ ,
- а  $\phi_i$  — функция выигрышей  $i$ -го игрока.
- Набор стратегий игроков  $s = (s_1, s_2, \dots, s_n)$ ,  $s_i \in S_i$ ,  $i = 1, \dots, n$ , называется *ситуацией* или *партией*.
- Функции  $\phi_i$  выигрышей игроков определены на множестве ситуаций  $S = S_1 \times \dots \times S_n$ .
- Игроки одновременно объявляют свои стратегии  $s_1 \in S_1, \dots, s_n \in S_n$ ,
- и в сложившейся ситуации  $s = (s_1, \dots, s_n)$  игрок  $i$  выигрывает  $\phi_i(s)$ ,  $i = 1, \dots, n$ .

# Стратегическая форма бескоалиционной игры

- *Бескоалиционной игрой* (в стратегической форме)  $n$  игроков называется тройка

$$\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N}),$$

где

- $N = \{1, \dots, n\}$  есть множество игроков,
- $S_i$  — множество стратегий игрока  $i$ ,
- а  $\phi_i$  — функция выигрышей  $i$ -го игрока.
- Набор стратегий игроков  $s = (s_1, s_2, \dots, s_n)$ ,  $s_i \in S_i$ ,  $i = 1, \dots, n$ , называется *ситуацией* или *партией*.
- Функции  $\phi_i$  выигрышей игроков определены на множестве ситуаций  $S = S_1 \times \dots \times S_n$ .
- Игроки одновременно объявляют свои стратегии  $s_1 \in S_1, \dots, s_n \in S_n$ ,
- и в сложившейся ситуации  $s = (s_1, \dots, s_n)$  игрок  $i$  выигрывает  $\phi_i(s)$ ,  $i = 1, \dots, n$ .

# Стратегическая форма бескоалиционной игры

- *Бескоалиционной игрой* (в стратегической форме)  $n$  игроков называется тройка

$$\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N}),$$

где

- $N = \{1, \dots, n\}$  есть множество игроков,
  - $S_i$  — множество стратегий игрока  $i$ ,
  - а  $\phi_i$  — функция выигрышей  $i$ -го игрока.
- Набор стратегий игроков  $s = (s_1, s_2, \dots, s_n)$ ,  $s_i \in S_i$ ,  $i = 1, \dots, n$ , называется *ситуацией* или *партией*.
  - Функции  $\phi_i$  выигрышей игроков определены на множестве ситуаций  $S = S_1 \times \dots \times S_n$ .
  - Игроки одновременно объявляют свои стратегии  $s_1 \in S_1, \dots, s_n \in S_n$ ,
  - и в сложившейся ситуации  $s = (s_1, \dots, s_n)$  игрок  $i$  выигрывает  $\phi_i(s)$ ,  $i = 1, \dots, n$ .

# Стратегическая форма бескоалиционной игры

- *Бескоалиционной игрой* (в стратегической форме)  $n$  игроков называется тройка

$$\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N}),$$

где

- $N = \{1, \dots, n\}$  есть множество игроков,
  - $S_i$  — множество стратегий игрока  $i$ ,
  - а  $\phi_i$  — функция выигрышей  $i$ -го игрока.
- Набор стратегий игроков  $s = (s_1, s_2, \dots, s_n)$ ,  $s_i \in S_i$ ,  $i = 1, \dots, n$ , называется *ситуацией* или *партией*.
  - Функции  $\phi_i$  выигрышей игроков определены на множестве ситуаций  $S = S_1 \times \dots \times S_n$ .
  - Игроки одновременно объявляют свои стратегии  $s_1 \in S_1, \dots, s_n \in S_n$ ,
  - и в сложившейся ситуации  $s = (s_1, \dots, s_n)$  игрок  $i$  выигрывает  $\phi_i(s)$ ,  $i = 1, \dots, n$ .



# Стратегическая форма бескоалиционной игры

- *Бескоалиционной игрой* (в стратегической форме)  $n$  игроков называется тройка

$$\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N}),$$

где

- $N = \{1, \dots, n\}$  есть множество игроков,
- $S_i$  — множество стратегий игрока  $i$ ,
- а  $\phi_i$  — функция выигрышей  $i$ -го игрока.
- Набор стратегий игроков  $s = (s_1, s_2, \dots, s_n)$ ,  $s_i \in S_i$ ,  $i = 1, \dots, n$ , называется *ситуацией* или *партией*.
- **Функции  $\phi_i$  выигрышей игроков определены на множестве ситуаций  $S = S_1 \times \dots \times S_n$ .**
- Игроки одновременно объявляют свои стратегии  $s_1 \in S_1, \dots, s_n \in S_n$ ,
- и в сложившейся ситуации  $s = (s_1, \dots, s_n)$  игрок  $i$  выигрывает  $\phi_i(s)$ ,  $i = 1, \dots, n$ .

# Стратегическая форма бескоалиционной игры

- *Бескоалиционной игрой* (в стратегической форме)  $n$  игроков называется тройка

$$\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N}),$$

где

- $N = \{1, \dots, n\}$  есть множество игроков,
- $S_i$  — множество стратегий игрока  $i$ ,
- а  $\phi_i$  — функция выигрышей  $i$ -го игрока.
- Набор стратегий игроков  $s = (s_1, s_2, \dots, s_n)$ ,  $s_i \in S_i$ ,  $i = 1, \dots, n$ , называется *ситуацией* или *партией*.
- Функции  $\phi_i$  выигрышей игроков определены на множестве ситуаций  $S = S_1 \times \dots \times S_n$ .
- **Игроки одновременно объявляют свои стратегии  $s_1 \in S_1, \dots, s_n \in S_n$ ,**
- и в сложившейся ситуации  $s = (s_1, \dots, s_n)$  игрок  $i$  выигрывает  $\phi_i(s)$ ,  $i = 1, \dots, n$ .

# Стратегическая форма бескоалиционной игры

- *Бескоалиционной игрой* (в стратегической форме)  $n$  игроков называется тройка

$$\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N}),$$

где

- $N = \{1, \dots, n\}$  есть множество игроков,
- $S_i$  — множество стратегий игрока  $i$ ,
- а  $\phi_i$  — функция выигрышей  $i$ -го игрока.
- Набор стратегий игроков  $s = (s_1, s_2, \dots, s_n)$ ,  $s_i \in S_i$ ,  $i = 1, \dots, n$ , называется *ситуацией* или *партией*.
- Функции  $\phi_i$  выигрышей игроков определены на множестве ситуаций  $S = S_1 \times \dots \times S_n$ .
- Игроки одновременно объявляют свои стратегии  $s_1 \in S_1, \dots, s_n \in S_n$ ,
- и в сложившейся ситуации  $s = (s_1, \dots, s_n)$  игрок  $i$  выигрывает  $\phi_i(s)$ ,  $i = 1, \dots, n$ .

# Полезные обозначения

- Рассмотрим ситуацию  $s = (s_1, \dots, s_{i-1}, s_i, s_{i+1}, \dots, s_n) \in S$ .
- Набор  $(s_1, \dots, s_{i-1}, s_{i+1}, \dots, s_n)$  стратегий оппонентов игрока  $i$  обозначают через  $s_{-i}$ .
- Ситуация  $(s_1, \dots, s_{i-1}, \bar{s}_i, s_{i+1}, \dots, s_n)$ , которая получается из ситуации  $s$  заменой стратегии  $s_i$  игрока  $i$  на стратегию  $\bar{s}_i$ , обозначается через  $(\bar{s}_i, s_{-i})$ .

# Полезные обозначения

- Рассмотрим ситуацию  $s = (s_1, \dots, s_{i-1}, s_i, s_{i+1}, \dots, s_n) \in S$ .
- Набор  $(s_1, \dots, s_{i-1}, s_{i+1}, \dots, s_n)$  стратегий оппонентов игрока  $i$  обозначают через  $s_{-i}$ .
- Ситуация  $(s_1, \dots, s_{i-1}, \bar{s}_i, s_{i+1}, \dots, s_n)$ , которая получается из ситуации  $s$  заменой стратегии  $s_i$  игрока  $i$  на стратегию  $\bar{s}_i$ , обозначается через  $(\bar{s}_i, s_{-i})$ .

# Полезные обозначения

- Рассмотрим ситуацию  $s = (s_1, \dots, s_{i-1}, s_i, s_{i+1}, \dots, s_n) \in S$ .
- Набор  $(s_1, \dots, s_{i-1}, s_{i+1}, \dots, s_n)$  стратегий оппонентов игрока  $i$  обозначают через  $s_{-i}$ .
- Ситуация  $(s_1, \dots, s_{i-1}, \bar{s}_i, s_{i+1}, \dots, s_n)$ , которая получается из ситуации  $s$  заменой стратегии  $s_i$  игрока  $i$  на стратегию  $\bar{s}_i$ , обозначается через  $(\bar{s}_i, s_{-i})$ .

# Ситуации равновесия

## Определение

Ситуация  $s$  называется *ситуацией равновесия (Нэша)* в бескоалиционной игре  $\gamma$ , если выполняется следующее условие:

$$\phi_i(s) \geq \phi_i(\bar{s}_i, s_{-i}) \quad \text{для всех } \bar{s}_i \in S_i, i \in N. \quad (1)$$

Содержательно, неравенства (1) означают, что

*в ситуации равновесия ни одному игроку в отдельности не выгодно менять свою стратегию.*

# Ситуации равновесия

## Определение

Ситуация  $s$  называется *ситуацией равновесия (Нэша)* в бескоалиционной игре  $\gamma$ , если выполняется следующее условие:

$$\phi_i(s) \geq \phi_i(\bar{s}_i, s_{-i}) \quad \text{для всех } \bar{s}_i \in S_i, i \in N. \quad (1)$$

Содержательно, неравенства (1) означают, что

*в ситуации равновесия ни одному игроку в отдельности не выгодно менять свою стратегию.*



# Ситуации равновесия

## Определение

Ситуация  $s$  называется *ситуацией равновесия (Нэша)* в бескоалиционной игре  $\gamma$ , если выполняется следующее условие:

$$\phi_i(s) \geq \phi_i(\bar{s}_i, s_{-i}) \quad \text{для всех } \bar{s}_i \in S_i, i \in N. \quad (1)$$

Содержательно, неравенства (1) означают, что

*в ситуации равновесия ни одному игроку в отдельности не выгодно менять свою стратегию.*

# Ситуации равновесия

## Определение

Ситуация  $s$  называется *ситуацией равновесия (Нэша)* в бескоалиционной игре  $\gamma$ , если выполняется следующее условие:

$$\phi_i(s) \geq \phi_i(\bar{s}_i, s_{-i}) \quad \text{для всех } \bar{s}_i \in S_i, i \in N. \quad (1)$$

Содержательно, неравенства (1) означают, что

*в ситуации равновесия ни одному игроку в отдельности не выгодно менять свою стратегию.*

# Ситуации равновесия

- Переписав условие

$$\phi_i(s) \geq \phi_i(\bar{s}_i, s_{-i}) \quad \text{для всех } \bar{s}_i \in S_i, i \in N. \quad (1)$$

- в следующем эквивалентном виде

$$s_i \in \arg \max_{\bar{s}_i \in S_i} \phi_i(\bar{s}_i, s_{-i}) \quad \text{для всех } i \in N, \quad (2)$$

- мы можем сказать, что

*в ситуации равновесия стратегия каждого игрока является его оптимальным ответом на стратегии других игроков.*

# Ситуации равновесия

- Переписав условие

$$\phi_i(s) \geq \phi_i(\bar{s}_i, s_{-i}) \quad \text{для всех } \bar{s}_i \in S_i, \quad i \in N. \quad (1)$$

- в следующем эквивалентном виде

$$s_i \in \arg \max_{\bar{s}_i \in S_i} \phi_i(\bar{s}_i, s_{-i}) \quad \text{для всех } i \in N, \quad (2)$$

- мы можем сказать, что

*в ситуации равновесия стратегия каждого игрока является его оптимальным ответом на стратегии других игроков.*

# Ситуации равновесия

- Переписав условие

$$\phi_i(s) \geq \phi_i(\bar{s}_i, s_{-i}) \quad \text{для всех } \bar{s}_i \in S_i, \quad i \in N. \quad (1)$$

- в следующем эквивалентном виде

$$s_i \in \arg \max_{\bar{s}_i \in S_i} \phi_i(\bar{s}_i, s_{-i}) \quad \text{для всех } i \in N, \quad (2)$$

- **МЫ МОЖЕМ СКАЗАТЬ, ЧТО**

*в ситуации равновесия стратегия каждого игрока является его оптимальным ответом на стратегии других игроков.*

# Ситуации равновесия

- Переписав условие

$$\phi_i(s) \geq \phi_i(\bar{s}_i, s_{-i}) \quad \text{для всех } \bar{s}_i \in S_i, \quad i \in N. \quad (1)$$

- в следующем эквивалентном виде

$$s_i \in \arg \max_{\bar{s}_i \in S_i} \phi_i(\bar{s}_i, s_{-i}) \quad \text{для всех } i \in N, \quad (2)$$

- мы можем сказать, что

*в ситуации равновесия стратегия каждого игрока является его оптимальным ответом на стратегии других игроков.*

# Содержание

- 1 Бескоалиционные игры, равновесие Нэша
  - Стратегическая форма бескоалиционной игры
  - Примеры бескоалиционных игр
  - Доминирование
- 2 Выпуклые игры
  - Теорема Нэша
  - Итерационный алгоритм решения выпуклых игр
- 3 Конечные бескоалиционные игры
  - Смешанные стратегии
  - Равновесие в смешанных стратегиях

# Пример 1: конечная бескоалиционная игра

Каждый из трех игроков имеет две стратегии, а платежи определяются по правилу:

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

Игрок 3

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

Игрок 3

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 5, 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

Здесь  $N = \{1, 2, 3\}$ ,

$S_1 = S_2 = S_3 = \{1, 2\}$ .

В ситуации  $s = (2, 1, 2)$ ,  
игрок 1 выбирает табл. 2,  
игрок 2 — строку 1,  
а игрок 3 — столбец 2.

Выигрыши игроков:

$$\phi_1(2, 1, 2) = 2,$$

$$\phi_2(2, 1, 2) = 1,$$

$$\phi_3(2, 1, 2) = 0.$$



# Пример 1: конечная бескоалиционная игра

Каждый из трех игроков имеет две стратегии, а платежи определяются по правилу:

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

Игрок 3

Игрок 2

	1	2
1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

Игрок 3

Игрок 2

	1	2
1	(1, 5, 5)	(2, 1, 0)
2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

Здесь  $N = \{1, 2, 3\}$ ,

$S_1 = S_2 = S_3 = \{1, 2\}$ .

В ситуации  $s = (2, 1, 2)$ ,  
игрок 1 выбирает табл. 2,  
игрок 2 — строку 1,  
а игрок 3 — столбец 2.

Выигрыши игроков:

$$\phi_1(2, 1, 2) = 2,$$

$$\phi_2(2, 1, 2) = 1,$$

$$\phi_3(2, 1, 2) = 0.$$

# Пример 1: конечная бескоалиционная игра

Каждый из трех игроков имеет две стратегии, а платежи определяются по правилу:

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

Игрок 3

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

Игрок 3

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 5, 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

Здесь  $N = \{1, 2, 3\}$ ,

$S_1 = S_2 = S_3 = \{1, 2\}$ .

В ситуации  $s = (2, 1, 2)$ ,  
игрок 1 выбирает табл. 2,  
игрок 2 — строку 1,  
а игрок 3 — столбец 2.

Выигрыши игроков:

$\phi_1(2, 1, 2) = 2$ ,

$\phi_2(2, 1, 2) = 1$ ,

$\phi_3(2, 1, 2) = 0$ .

# Пример 1: конечная бескоалиционная игра

Каждый из трех игроков имеет две стратегии, а платежи определяются по правилу:

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

Игрок 3

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

Игрок 3

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 5, 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

Здесь  $N = \{1, 2, 3\}$ ,

$S_1 = S_2 = S_3 = \{1, 2\}$ .

В ситуации  $s = (2, 1, 2)$ ,  
игрок 1 выбирает табл. 2,  
игрок 2 — строку 1,  
а игрок 3 — столбец 2.

Выигрыши игроков:

$$\phi_1(2, 1, 2) = 2,$$

$$\phi_2(2, 1, 2) = 1,$$

$$\phi_3(2, 1, 2) = 0.$$

# Пример 1: конечная бескоалиционная игра

Каждый из трех игроков имеет две стратегии, а платежи определяются по правилу:

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

Игрок 3

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

Игрок 3

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 5, 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

Здесь  $N = \{1, 2, 3\}$ ,

$S_1 = S_2 = S_3 = \{1, 2\}$ .

В ситуации  $s = (2, 1, 2)$ ,  
игрок 1 выбирает табл. 2,  
игрок 2 — строку 1,  
а игрок 3 — столбец 2.

Выигрыши игроков:

$$\phi_1(2, 1, 2) = 2,$$

$$\phi_2(2, 1, 2) = 1,$$

$$\phi_3(2, 1, 2) = 0.$$

# Пример 1: конечная бескоалиционная игра

Каждый из трех игроков имеет две стратегии, а платежи определяются по правилу:

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

Игрок 3

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

Игрок 3

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 5, 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

Здесь  $N = \{1, 2, 3\}$ ,

$S_1 = S_2 = S_3 = \{1, 2\}$ .

**В ситуации  $s = (2, 1, 2)$ ,**

игрок 1 выбирает табл. 2,

игрок 2 — строку 1,

а игрок 3 — столбец 2.

Выигрыши игроков:

$$\phi_1(2, 1, 2) = 2,$$

$$\phi_2(2, 1, 2) = 1,$$

$$\phi_3(2, 1, 2) = 0.$$

# Пример 1: конечная бескоалиционная игра

Каждый из трех игроков имеет две стратегии, а платежи определяются по правилу:

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 5, 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

Здесь  $N = \{1, 2, 3\}$ ,

$S_1 = S_2 = S_3 = \{1, 2\}$ .

В ситуации  $s = (2, 1, 2)$ ,

**игрок 1 выбирает табл. 2,**

игрок 2 — строку 1,

а игрок 3 — столбец 2.

Выигрыши игроков:

$$\phi_1(2, 1, 2) = 2,$$

$$\phi_2(2, 1, 2) = 1,$$

$$\phi_3(2, 1, 2) = 0.$$

# Пример 1: конечная бескоалиционная игра

Каждый из трех игроков имеет две стратегии, а платежи определяются по правилу:

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 5, 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

Здесь  $N = \{1, 2, 3\}$ ,

$S_1 = S_2 = S_3 = \{1, 2\}$ .

В ситуации  $s = (2, 1, 2)$ ,  
игрок 1 выбирает табл. 2,  
**игрок 2 — строку 1,**

а игрок 3 — столбец 2.

Выигрыши игроков:

$\phi_1(2, 1, 2) = 2$ ,

$\phi_2(2, 1, 2) = 1$ ,

$\phi_3(2, 1, 2) = 0$ .

# Пример 1: конечная бескоалиционная игра

Каждый из трех игроков имеет две стратегии, а платежи определяются по правилу:

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 5, 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

Здесь  $N = \{1, 2, 3\}$ ,

$S_1 = S_2 = S_3 = \{1, 2\}$ .

В ситуации  $s = (2, 1, 2)$ ,  
игрок 1 выбирает табл. 2,  
игрок 2 — строку 1,  
а игрок 3 — столбец 2.

Выигрыши игроков:

$$\phi_1(2, 1, 2) = 2,$$

$$\phi_2(2, 1, 2) = 1,$$

$$\phi_3(2, 1, 2) = 0.$$



# Пример 1: конечная бескоалиционная игра

Каждый из трех игроков имеет две стратегии, а платежи определяются по правилу:

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 5, 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

Здесь  $N = \{1, 2, 3\}$ ,

$S_1 = S_2 = S_3 = \{1, 2\}$ .

В ситуации  $s = (2, 1, 2)$ ,  
игрок 1 выбирает табл. 2,  
игрок 2 — строку 1,  
а игрок 3 — столбец 2.

Выигрыши игроков:

$$\phi_1(2, 1, 2) = 2,$$

$$\phi_2(2, 1, 2) = 1,$$

$$\phi_3(2, 1, 2) = 0.$$

# Пример 1: конечная бескоалиционная игра

Каждый из трех игроков имеет две стратегии, а платежи определяются по правилу:

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 5, 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

Здесь  $N = \{1, 2, 3\}$ ,

$S_1 = S_2 = S_3 = \{1, 2\}$ .

В ситуации  $s = (2, 1, 2)$ ,  
игрок 1 выбирает табл. 2,  
игрок 2 — строку 1,  
а игрок 3 — столбец 2.

Выигрыши игроков:

$$\phi_1(2, 1, 2) = 2,$$

$$\phi_2(2, 1, 2) = 1,$$

$$\phi_3(2, 1, 2) = 0.$$

# Пример 1: конечная бескоалиционная игра

Каждый из трех игроков имеет две стратегии, а платежи определяются по правилу:

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 5, 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

Здесь  $N = \{1, 2, 3\}$ ,

$S_1 = S_2 = S_3 = \{1, 2\}$ .

В ситуации  $s = (2, 1, 2)$ ,  
игрок 1 выбирает табл. 2,  
игрок 2 — строку 1,  
а игрок 3 — столбец 2.

Выигрыши игроков:

$$\phi_1(2, 1, 2) = 2,$$

$$\phi_2(2, 1, 2) = 1,$$

$$\phi_3(2, 1, 2) = 0.$$

# Пример 1: конечная бескоалиционная игра

Каждый из трех игроков имеет две стратегии, а платежи определяются по правилу:

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Здесь  $N = \{1, 2, 3\}$ ,

$S_1 = S_2 = S_3 = \{1, 2\}$ .

В ситуации  $s = (2, 1, 2)$ ,  
игрок 1 выбирает табл. 2,  
игрок 2 — строку 1,  
а игрок 3 — столбец 2.

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 5, 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

Выигрыши игроков:

$$\phi_1(2, 1, 2) = 2,$$

$$\phi_2(2, 1, 2) = 1,$$

$$\phi_3(2, 1, 2) = 0.$$

# Пример 1: ситуации равновесия

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

Игрок 3

		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

Игрок 3

		1	2
Игрок 2	1	(1, 5, 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

Ситуация	Игрок, которому выгодно менять стратегию
(1, 1, 1)	3
(1, 1, 2)	2
(1, 2, 1)	1
(1, 2, 2)	1
(2, 1, 1)	—
(2, 1, 2)	3
(2, 2, 1)	2
(2, 2, 2)	—

# Пример 1: ситуации равновесия

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

Игрок 3

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

Игрок 3

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 5, 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

Ситуация	Игрок, которому выгодно менять стратегию
(1, 1, 1)	3
(1, 1, 2)	2
(1, 2, 1)	1
(1, 2, 2)	1
(2, 1, 1)	—
(2, 1, 2)	3
(2, 2, 1)	2
(2, 2, 2)	—

# Пример 1: ситуации равновесия

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

Игрок 3

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

Игрок 3

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 5, 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

Ситуация	Игрок, которому выгодно менять стратегию
(1, 1, 1)	3
(1, 1, 2)	2
(1, 2, 1)	1
(1, 2, 2)	1
(2, 1, 1)	—
(2, 1, 2)	3
(2, 2, 1)	2
(2, 2, 2)	—

# Пример 1: ситуации равновесия

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

Игрок 3

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

Игрок 3

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 5, 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

Ситуация	Игрок, которому выгодно менять стратегию
(1, 1, 1)	3
(1, 1, 2)	2
(1, 2, 1)	1
(1, 2, 2)	1
(2, 1, 1)	—
(2, 1, 2)	3
(2, 2, 1)	2
(2, 2, 2)	—



# Пример 1: ситуации равновесия

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

Игрок 3

		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

Игрок 3

		1	2
Игрок 2	1	(1, 5, 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

Ситуация	Игрок, которому выгодно менять стратегию
(1, 1, 1)	3
(1, 1, 2)	2
(1, 2, 1)	1
(1, 2, 2)	1
(2, 1, 1)	—
(2, 1, 2)	3
(2, 2, 1)	2
(2, 2, 2)	—

# Пример 1: ситуации равновесия

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

Игрок 3

		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

Игрок 3

		1	2
Игрок 2	1	(1, 5, 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

Ситуация	Игрок, которому выгодно менять стратегию
(1, 1, 1)	3
(1, 1, 2)	2
(1, 2, 1)	1
(1, 2, 2)	1
(2, 1, 1)	—
(2, 1, 2)	3
(2, 2, 1)	2
(2, 2, 2)	—

# Пример 1: ситуации равновесия

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

Игрок 3

		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

Игрок 3

		1	2
Игрок 2	1	(1, 5, 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

Ситуация	Игрок, которому выгодно менять стратегию
(1, 1, 1)	3
(1, 1, 2)	2
(1, 2, 1)	1
(1, 2, 2)	1
(2, 1, 1)	—
(2, 1, 2)	3
(2, 2, 1)	2
(2, 2, 2)	—

# Пример 1: ситуации равновесия

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

Игрок 3

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

Игрок 3

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 5, 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

Ситуация	Игрок, которому выгодно менять стратегию
(1, 1, 1)	3
(1, 1, 2)	2
(1, 2, 1)	1
(1, 2, 2)	1
(2, 1, 1)	—
(2, 1, 2)	3
(2, 2, 1)	2
(2, 2, 2)	—

# Пример 1: ситуации равновесия

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

Игрок 3

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

Игрок 3

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 5, 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

Ситуация	Игрок, которому выгодно менять стратегию
(1, 1, 1)	3
(1, 1, 2)	2
(1, 2, 1)	1
(1, 2, 2)	1
(2, 1, 1)	—
(2, 1, 2)	3
(2, 2, 1)	2
(2, 2, 2)	—

# Пример 1: ситуации равновесия

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

Игрок 3

		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

Игрок 3

		1	2
Игрок 2	1	(1, 5, 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

Ситуация	Игрок, которому выгодно менять стратегию
(1, 1, 1)	3
(1, 1, 2)	2
(1, 2, 1)	1
(1, 2, 2)	1
(2, 1, 1)	—
(2, 1, 2)	3
(2, 2, 1)	2
(2, 2, 2)	—

# Пример 1: ситуации равновесия

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

Игрок 3

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

Игрок 3

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 5, 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

Ситуация	Игрок, которому выгодно менять стратегию
(1, 1, 1)	3
(1, 1, 2)	2
(1, 2, 1)	1
(1, 2, 2)	1
(2, 1, 1)	—
(2, 1, 2)	3
(2, 2, 1)	2
(2, 2, 2)	—

# Пример 1: ситуации равновесия

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

Игрок 3

		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

Игрок 3

		1	2
Игрок 2	1	(1, <b>5</b> , 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, <b>0</b> , 1)	(4, 1, 1)

Ситуация	Игрок, которому выгодно менять стратегию
(1, 1, 1)	3
(1, 1, 2)	2
(1, 2, 1)	1
(1, 2, 2)	1
<b>(2, 1, 1)</b>	—
(2, 1, 2)	3
(2, 2, 1)	2
(2, 2, 2)	—



# Пример 1: ситуации равновесия

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

Игрок 3

		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

Игрок 3

		1	2
Игрок 2	1	(1, 5, 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

Ситуация	Игрок, которому выгодно менять стратегию
(1, 1, 1)	3
(1, 1, 2)	2
(1, 2, 1)	1
(1, 2, 2)	1
<b>(2, 1, 1)</b>	—
(2, 1, 2)	3
(2, 2, 1)	2
(2, 2, 2)	—

# Пример 1: ситуации равновесия

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

Игрок 3

		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

Игрок 3

		1	2
Игрок 2	1	(1, 5, 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

Ситуация	Игрок, которому выгодно менять стратегию
(1, 1, 1)	3
(1, 1, 2)	2
(1, 2, 1)	1
(1, 2, 2)	1
<b>(2, 1, 1)</b>	—
(2, 1, 2)	3
(2, 2, 1)	2
(2, 2, 2)	—

# Пример 1: ситуации равновесия

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

Игрок 3

		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

Игрок 3

		1	2
Игрок 2	1	(1, 5, 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

Ситуация	Игрок, которому выгодно менять стратегию
(1, 1, 1)	3
(1, 1, 2)	2
(1, 2, 1)	1
(1, 2, 2)	1
(2, 1, 1)	—
(2, 1, 2)	3
(2, 2, 1)	2
(2, 2, 2)	—

# Пример 1: ситуации равновесия

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

Игрок 3

		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

Игрок 3

		1	2
Игрок 2	1	(1, 5, <b>5</b> )	(2, 1, <b>0</b> )
	2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

Ситуация	Игрок, которому выгодно менять стратегию
(1, 1, 1)	3
(1, 1, 2)	2
(1, 2, 1)	1
(1, 2, 2)	1
(2, 1, 1)	—
<b>(2, 1, 2)</b>	<b>3</b>
(2, 2, 1)	2
(2, 2, 2)	—

# Пример 1: ситуации равновесия

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

Игрок 3

		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

Игрок 3

		1	2
Игрок 2	1	(1, 5, 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

Ситуация	Игрок, которому выгодно менять стратегию
(1, 1, 1)	3
(1, 1, 2)	2
(1, 2, 1)	1
(1, 2, 2)	1
(2, 1, 1)	—
(2, 1, 2)	3
(2, 2, 1)	2
(2, 2, 2)	—

# Пример 1: ситуации равновесия

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

Игрок 3

		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

Игрок 3

		1	2
Игрок 2	1	(1, <b>5</b> , 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, <b>0</b> , 1)	(4, 1, 1)

Ситуация	Игрок, которому выгодно менять стратегию
(1, 1, 1)	3
(1, 1, 2)	2
(1, 2, 1)	1
(1, 2, 2)	1
(2, 1, 1)	—
(2, 1, 2)	3
<b>(2, 2, 1)</b>	<b>2</b>
(2, 2, 2)	—

# Пример 1: ситуации равновесия

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

Игрок 3

		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

Игрок 3

		1	2
Игрок 2	1	(1, 5, 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

Ситуация	Игрок, которому выгодно менять стратегию
(1, 1, 1)	3
(1, 1, 2)	2
(1, 2, 1)	1
(1, 2, 2)	1
(2, 1, 1)	—
(2, 1, 2)	3
(2, 2, 1)	2
(2, 2, 2)	—

# Пример 1: ситуации равновесия

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

Игрок 3

		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

Игрок 3

		1	2
Игрок 2	1	(1, 5, 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

Ситуация	Игрок, которому выгодно менять стратегию
(1, 1, 1)	3
(1, 1, 2)	2
(1, 2, 1)	1
(1, 2, 2)	1
(2, 1, 1)	—
(2, 1, 2)	3
(2, 2, 1)	2
(2, 2, 2)	—



# Пример 1: ситуации равновесия

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

Игрок 3

		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

Игрок 3

		1	2
Игрок 2	1	(1, 5, 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

Ситуация	Игрок, которому выгодно менять стратегию
(1, 1, 1)	3
(1, 1, 2)	2
(1, 2, 1)	1
(1, 2, 2)	1
(2, 1, 1)	—
(2, 1, 2)	3
(2, 2, 1)	2
(2, 2, 2)	—

# Пример 1: ситуации равновесия

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

Игрок 3

		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

Игрок 3

		1	2
Игрок 2	1	(1, 5, 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

Ситуация	Игрок, которому выгодно менять стратегию
(1, 1, 1)	3
(1, 1, 2)	2
(1, 2, 1)	1
(1, 2, 2)	1
(2, 1, 1)	—
(2, 1, 2)	3
(2, 2, 1)	2
(2, 2, 2)	—

# Пример 1: ситуации равновесия

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

Игрок 3

		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

Игрок 3

		1	2
Игрок 2	1	(1, 5, 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

Ситуация	Игрок, которому выгодно менять стратегию
(1, 1, 1)	3
(1, 1, 2)	2
(1, 2, 1)	1
(1, 2, 2)	1
(2, 1, 1)	—
(2, 1, 2)	3
(2, 2, 1)	2
(2, 2, 2)	—

# Пример 1: ситуации равновесия

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

Игрок 3

		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

Игрок 3

		1	2
Игрок 2	1	(1, 5, 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

Ситуация	Игрок, которому выгодно менять стратегию
(1, 1, 1)	3
(1, 1, 2)	2
(1, 2, 1)	1
(1, 2, 2)	1
(2, 1, 1)	—
(2, 1, 2)	3
(2, 2, 1)	2
(2, 2, 2)	—

Ответ: две ситуации равновесия  $s^1 = (2, 1, 1)$  и  $s^2 = (2, 2, 2)$ .

# Пример 2: бесконечное число ситуаций равновесия

## Азартная игра Нэша

- Два игрока делят сумму денег  $d$ .
- Игрок 1 хочет получить долю  $x$  ( $0 \leq x \leq d$ ),
- а игрок 2 — долю  $y$  ( $0 \leq y \leq d$ ).
- Если  $x + y \leq d$ , то игрок 1 получит  $x$ , а игрок 2 —  $y$ .
- Когда  $x + y > d$ , оба игрока ничего не получат.
- Нужно записать стратегическую форму для данной бескоалиционной игры и найти все ситуации равновесия.

Здесь  $N = \{1, 2\}$  и  $S_1 = S_2 = [0, d]$ .

В ситуации  $(x, y) \in [0, d]^2$  выигрыши игроков определяются по формулам:

$$\phi_1(x, y) = \begin{cases} x, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d, \end{cases} \quad \phi_2(x, y) = \begin{cases} y, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d. \end{cases}$$

# Пример 2: бесконечное число ситуаций равновесия

## Азартная игра Нэша

- Два игрока делят сумму денег  $d$ .
- Игрок 1 хочет получить долю  $x$  ( $0 \leq x \leq d$ ),
- а игрок 2 — долю  $y$  ( $0 \leq y \leq d$ ).
- Если  $x + y \leq d$ , то игрок 1 получит  $x$ , а игрок 2 —  $y$ .
- Когда  $x + y > d$ , оба игрока ничего не получат.
- Нужно записать стратегическую форму для данной бескоалиционной игры и найти все ситуации равновесия.

Здесь  $N = \{1, 2\}$  и  $S_1 = S_2 = [0, d]$ .

В ситуации  $(x, y) \in [0, d]^2$  выигрыши игроков определяются по формулам:

$$\phi_1(x, y) = \begin{cases} x, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d, \end{cases} \quad \phi_2(x, y) = \begin{cases} y, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d. \end{cases}$$

# Пример 2: бесконечное число ситуаций равновесия

## Азартная игра Нэша

- Два игрока делят сумму денег  $d$ .
- **Игрок 1 хочет получить долю  $x$  ( $0 \leq x \leq d$ ),**
- а игрок 2 — долю  $y$  ( $0 \leq y \leq d$ ).
- Если  $x + y \leq d$ , то игрок 1 получит  $x$ , а игрок 2 —  $y$ .
- Когда  $x + y > d$ , оба игрока ничего не получат.
- Нужно записать стратегическую форму для данной бескоалиционной игры и найти все ситуации равновесия.

Здесь  $N = \{1, 2\}$  и  $S_1 = S_2 = [0, d]$ .

В ситуации  $(x, y) \in [0, d]^2$  выигрыши игроков определяются по формулам:

$$\phi_1(x, y) = \begin{cases} x, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d, \end{cases} \quad \phi_2(x, y) = \begin{cases} y, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d. \end{cases}$$

# Пример 2: бесконечное число ситуаций равновесия

## Азартная игра Нэша

- Два игрока делят сумму денег  $d$ .
- Игрок 1 хочет получить долю  $x$  ( $0 \leq x \leq d$ ),
- а игрок 2 — долю  $y$  ( $0 \leq y \leq d$ ).
- Если  $x + y \leq d$ , то игрок 1 получит  $x$ , а игрок 2 —  $y$ .
- Когда  $x + y > d$ , оба игрока ничего не получат.
- Нужно записать стратегическую форму для данной бескоалиционной игры и найти все ситуации равновесия.

Здесь  $N = \{1, 2\}$  и  $S_1 = S_2 = [0, d]$ .

В ситуации  $(x, y) \in [0, d]^2$  выигрыши игроков определяются по формулам:

$$\phi_1(x, y) = \begin{cases} x, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d, \end{cases} \quad \phi_2(x, y) = \begin{cases} y, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d. \end{cases}$$



# Пример 2: бесконечное число ситуаций равновесия

## Азартная игра Нэша

- Два игрока делят сумму денег  $d$ .
- Игрок 1 хочет получить долю  $x$  ( $0 \leq x \leq d$ ),
- а игрок 2 — долю  $y$  ( $0 \leq y \leq d$ ).
- Если  $x + y \leq d$ , то игрок 1 получит  $x$ , а игрок 2 —  $y$ .
- Когда  $x + y > d$ , оба игрока ничего не получат.
- Нужно записать стратегическую форму для данной бескоалиционной игры и найти все ситуации равновесия.

Здесь  $N = \{1, 2\}$  и  $S_1 = S_2 = [0, d]$ .

В ситуации  $(x, y) \in [0, d]^2$  выигрыши игроков определяются по формулам:

$$\phi_1(x, y) = \begin{cases} x, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d, \end{cases} \quad \phi_2(x, y) = \begin{cases} y, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d. \end{cases}$$

# Пример 2: бесконечное число ситуаций равновесия

## Азартная игра Нэша

- Два игрока делят сумму денег  $d$ .
- Игрок 1 хочет получить долю  $x$  ( $0 \leq x \leq d$ ),
- а игрок 2 — долю  $y$  ( $0 \leq y \leq d$ ).
- Если  $x + y \leq d$ , то игрок 1 получит  $x$ , а игрок 2 —  $y$ .
- **Когда  $x + y > d$ , оба игрока ничего не получают.**
- Нужно записать стратегическую форму для данной бескоалиционной игры и найти все ситуации равновесия.

Здесь  $N = \{1, 2\}$  и  $S_1 = S_2 = [0, d]$ .

В ситуации  $(x, y) \in [0, d]^2$  выигрыши игроков определяются по формулам:

$$\phi_1(x, y) = \begin{cases} x, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d, \end{cases} \quad \phi_2(x, y) = \begin{cases} y, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d. \end{cases}$$

# Пример 2: бесконечное число ситуаций равновесия

## Азартная игра Нэша

- Два игрока делят сумму денег  $d$ .
- Игрок 1 хочет получить долю  $x$  ( $0 \leq x \leq d$ ),
- а игрок 2 — долю  $y$  ( $0 \leq y \leq d$ ).
- Если  $x + y \leq d$ , то игрок 1 получит  $x$ , а игрок 2 —  $y$ .
- Когда  $x + y > d$ , оба игрока ничего не получат.
- **Нужно записать стратегическую форму для данной бескоалиционной игры и найти все ситуации равновесия.**

Здесь  $N = \{1, 2\}$  и  $S_1 = S_2 = [0, d]$ .

В ситуации  $(x, y) \in [0, d]^2$  выигрыши игроков определяются по формулам:

$$\phi_1(x, y) = \begin{cases} x, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d, \end{cases} \quad \phi_2(x, y) = \begin{cases} y, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d. \end{cases}$$

# Пример 2: бесконечное число ситуаций равновесия

## Азартная игра Нэша

- Два игрока делят сумму денег  $d$ .
- Игрок 1 хочет получить долю  $x$  ( $0 \leq x \leq d$ ),
- а игрок 2 — долю  $y$  ( $0 \leq y \leq d$ ).
- Если  $x + y \leq d$ , то игрок 1 получит  $x$ , а игрок 2 —  $y$ .
- Когда  $x + y > d$ , оба игрока ничего не получат.
- Нужно записать стратегическую форму для данной бескоалиционной игры и найти все ситуации равновесия.

Здесь  $N = \{1, 2\}$  и  $S_1 = S_2 = [0, d]$ .

В ситуации  $(x, y) \in [0, d]^2$  выигрыши игроков определяются по формулам:

$$\phi_1(x, y) = \begin{cases} x, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d, \end{cases} \quad \phi_2(x, y) = \begin{cases} y, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d. \end{cases}$$

# Пример 2: бесконечное число ситуаций равновесия

## Азартная игра Нэша

- Два игрока делят сумму денег  $d$ .
- Игрок 1 хочет получить долю  $x$  ( $0 \leq x \leq d$ ),
- а игрок 2 — долю  $y$  ( $0 \leq y \leq d$ ).
- Если  $x + y \leq d$ , то игрок 1 получит  $x$ , а игрок 2 —  $y$ .
- Когда  $x + y > d$ , оба игрока ничего не получат.
- Нужно записать стратегическую форму для данной бескоалиционной игры и найти все ситуации равновесия.

Здесь  $N = \{1, 2\}$  и  $S_1 = S_2 = [0, d]$ .

В ситуации  $(x, y) \in [0, d]^2$  выигрыши игроков определяются по формулам:

$$\phi_1(x, y) = \begin{cases} x, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d, \end{cases} \quad \phi_2(x, y) = \begin{cases} y, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d. \end{cases}$$

# Пример 2: бесконечное число ситуаций равновесия

## Азартная игра Нэша

- Два игрока делят сумму денег  $d$ .
- Игрок 1 хочет получить долю  $x$  ( $0 \leq x \leq d$ ),
- а игрок 2 — долю  $y$  ( $0 \leq y \leq d$ ).
- Если  $x + y \leq d$ , то игрок 1 получит  $x$ , а игрок 2 —  $y$ .
- Когда  $x + y > d$ , оба игрока ничего не получат.
- Нужно записать стратегическую форму для данной бескоалиционной игры и найти все ситуации равновесия.

Здесь  $N = \{1, 2\}$  и  $S_1 = S_2 = [0, d]$ .

В ситуации  $(x, y) \in [0, d]^2$  выигрыши игроков определяются по формулам:

$$\phi_1(x, y) = \begin{cases} x, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d, \end{cases} \quad \phi_2(x, y) = \begin{cases} y, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d. \end{cases}$$

# Пример 2: бесконечное число ситуаций равновесия

## Азартная игра Нэша

- Два игрока делят сумму денег  $d$ .
- Игрок 1 хочет получить долю  $x$  ( $0 \leq x \leq d$ ),
- а игрок 2 — долю  $y$  ( $0 \leq y \leq d$ ).
- Если  $x + y \leq d$ , то игрок 1 получит  $x$ , а игрок 2 —  $y$ .
- Когда  $x + y > d$ , оба игрока ничего не получат.
- Нужно записать стратегическую форму для данной бескоалиционной игры и найти все ситуации равновесия.

Здесь  $N = \{1, 2\}$  и  $S_1 = S_2 = [0, d]$ .

В ситуации  $(x, y) \in [0, d]^2$  выигрыши игроков определяются по формулам:

$$\phi_1(x, y) = \begin{cases} x, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d, \end{cases} \quad \phi_2(x, y) = \begin{cases} y, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d. \end{cases}$$

## Пример 2: ситуации равновесия в азартной игре Нэша

$$N = \{1, 2\}, \quad S_1 = S_2 = [0, d],$$

$$\phi_1(x, y) = \begin{cases} x, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d, \end{cases} \quad \phi_2(x, y) = \begin{cases} y, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d. \end{cases}$$

В данной игре — много ситуаций равновесия.

- 1 Все ситуации  $(x, y)$ , такие, что  $x + y = d$ . Если любой из игроков увеличит свою долю, то оба игрока ничего не получат. Если кто-то из игроков уменьшит свою долю, то его выигрыш уменьшится.
- 2 Ситуация  $(d, d)$ , когда каждый из игроков хочет получить всю сумму денег. В этой ситуации выигрыши игроков равны нулю. Если один из игроков требует всю сумму денег, то его оппонент ничего не получит.
- 3 Докажите, что в данной игре нет других ситуаций равновесия.



## Пример 2: ситуации равновесия в азартной игре Нэша

$$N = \{1, 2\}, \quad S_1 = S_2 = [0, d],$$

$$\phi_1(x, y) = \begin{cases} x, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d, \end{cases} \quad \phi_2(x, y) = \begin{cases} y, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d. \end{cases}$$

В данной игре — много ситуаций равновесия.

- 1 Все ситуации  $(x, y)$ , такие, что  $x + y = d$ . Если любой из игроков увеличит свою долю, то оба игрока ничего не получат. Если кто-то из игроков уменьшит свою долю, то его выигрыш уменьшится.
- 2 Ситуация  $(d, d)$ , когда каждый из игроков хочет получить всю сумму денег. В этой ситуации выигрыши игроков равны нулю. Если один из игроков требует всю сумму денег, то его оппонент ничего не получит.
- 3 Докажите, что в данной игре нет других ситуаций равновесия.

## Пример 2: ситуации равновесия в азартной игре Нэша

$$N = \{1, 2\}, \quad S_1 = S_2 = [0, d],$$

$$\phi_1(x, y) = \begin{cases} x, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d, \end{cases} \quad \phi_2(x, y) = \begin{cases} y, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d. \end{cases}$$

В данной игре — много ситуаций равновесия.

- ❶ Все ситуации  $(x, y)$ , такие, что  $x + y = d$ . Если любой из игроков увеличит свою долю, то оба игрока ничего не получат. Если кто-то из игроков уменьшит свою долю, то его выигрыш уменьшится.
- ❷ Ситуация  $(d, d)$ , когда каждый из игроков хочет получить всю сумму денег. В этой ситуации выигрыши игроков равны нулю. Если один из игроков требует всю сумму денег, то его оппонент ничего не получит.
- ❸ Докажите, что в данной игре нет других ситуаций равновесия.

## Пример 2: ситуации равновесия в азартной игре Нэша

$$N = \{1, 2\}, \quad S_1 = S_2 = [0, d],$$

$$\phi_1(x, y) = \begin{cases} x, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d, \end{cases} \quad \phi_2(x, y) = \begin{cases} y, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d. \end{cases}$$

В данной игре — много ситуаций равновесия.

- 1 Все ситуации  $(x, y)$ , такие, что  $x + y = d$ . Если любой из игроков увеличит свою долю, то оба игрока ничего не получат. Если кто-то из игроков уменьшит свою долю, то его выигрыш уменьшится.
- 2 Ситуация  $(d, d)$ , когда каждый из игроков хочет получить всю сумму денег. В этой ситуации выигрыши игроков равны нулю. Если один из игроков требует всю сумму денег, то его оппонент ничего не получит.
- 3 Докажите, что в данной игре нет других ситуаций равновесия.

## Пример 2: ситуации равновесия в азартной игре Нэша

$$N = \{1, 2\}, \quad S_1 = S_2 = [0, d],$$

$$\phi_1(x, y) = \begin{cases} x, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d, \end{cases} \quad \phi_2(x, y) = \begin{cases} y, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d. \end{cases}$$

В данной игре — много ситуаций равновесия.

- 1 Все ситуации  $(x, y)$ , такие, что  $x + y = d$ . Если любой из игроков увеличит свою долю, то оба игрока ничего не получат. **Если кто-то из игроков уменьшит свою долю, то его выигрыш уменьшится.**
- 2 Ситуация  $(d, d)$ , когда каждый из игроков хочет получить всю сумму денег. В этой ситуации выигрыши игроков равны нулю. Если один из игроков требует всю сумму денег, то его оппонент ничего не получит.
- 3 Докажите, что в данной игре нет других ситуаций равновесия.

## Пример 2: ситуации равновесия в азартной игре Нэша

$$N = \{1, 2\}, \quad S_1 = S_2 = [0, d],$$

$$\phi_1(x, y) = \begin{cases} x, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d, \end{cases} \quad \phi_2(x, y) = \begin{cases} y, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d. \end{cases}$$

В данной игре — много ситуаций равновесия.

- 1 Все ситуации  $(x, y)$ , такие, что  $x + y = d$ . Если любой из игроков увеличит свою долю, то оба игрока ничего не получат. Если кто-то из игроков уменьшит свою долю, то его выигрыш уменьшится.
- 2 Ситуация  $(d, d)$ , когда каждый из игроков хочет получить всю сумму денег. В этой ситуации выигрыши игроков равны нулю. Если один из игроков требует всю сумму денег, то его оппонент ничего не получит.
- 3 Докажите, что в данной игре нет других ситуаций равновесия.

## Пример 2: ситуации равновесия в азартной игре Нэша

$$N = \{1, 2\}, \quad S_1 = S_2 = [0, d],$$

$$\phi_1(x, y) = \begin{cases} x, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d, \end{cases} \quad \phi_2(x, y) = \begin{cases} y, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d. \end{cases}$$

В данной игре — много ситуаций равновесия.

- 1 Все ситуации  $(x, y)$ , такие, что  $x + y = d$ . Если любой из игроков увеличит свою долю, то оба игрока ничего не получат. Если кто-то из игроков уменьшит свою долю, то его выигрыш уменьшится.
- 2 Ситуация  $(d, d)$ , когда каждый из игроков хочет получить всю сумму денег. **В этой ситуации выигрыши игроков равны нулю.** Если один из игроков требует всю сумму денег, то его оппонент ничего не получит.
- 3 Докажите, что в данной игре нет других ситуаций равновесия.

## Пример 2: ситуации равновесия в азартной игре Нэша

$$N = \{1, 2\}, \quad S_1 = S_2 = [0, d],$$

$$\phi_1(x, y) = \begin{cases} x, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d, \end{cases} \quad \phi_2(x, y) = \begin{cases} y, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d. \end{cases}$$

В данной игре — много ситуаций равновесия.

- ❶ Все ситуации  $(x, y)$ , такие, что  $x + y = d$ . Если любой из игроков увеличит свою долю, то оба игрока ничего не получат. Если кто-то из игроков уменьшит свою долю, то его выигрыш уменьшится.
- ❷ Ситуация  $(d, d)$ , когда каждый из игроков хочет получить всю сумму денег. В этой ситуации выигрыши игроков равны нулю. **Если один из игроков требует всю сумму денег, то его оппонент ничего не получит.**
- ❸ Докажите, что в данной игре нет других ситуаций равновесия.

## Пример 2: ситуации равновесия в азартной игре Нэша

$$N = \{1, 2\}, \quad S_1 = S_2 = [0, d],$$

$$\phi_1(x, y) = \begin{cases} x, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d, \end{cases} \quad \phi_2(x, y) = \begin{cases} y, & \text{если } x + y \leq d, \\ 0, & \text{если } x + y > d. \end{cases}$$

В данной игре — много ситуаций равновесия.

- ❶ Все ситуации  $(x, y)$ , такие, что  $x + y = d$ . Если любой из игроков увеличит свою долю, то оба игрока ничего не получат. Если кто-то из игроков уменьшит свою долю, то его выигрыш уменьшится.
- ❷ Ситуация  $(d, d)$ , когда каждый из игроков хочет получить всю сумму денег. В этой ситуации выигрыши игроков равны нулю. Если один из игроков требует всю сумму денег, то его оппонент ничего не получит.
- ❸ **Докажите, что в данной игре нет других ситуаций равновесия.**



## Пример 3: «игра цен» (без ситуаций равновесия)

- Имеется 2 продавца одинак. продукта и 3 покупателя.
- Покупатель 1 знаком только с продавцом 1, покупатель 2 — только с продавцом 2, а покупатель 3 знает обоих продавцов.
- Каждому покупателю нужна только одна единица продукта, за которую он готов заплатить максимум 1.
- Продавец  $i \in \{1, 2\}$  назначает цену  $p_i \in [0, 1]$ .
- После этого покупатель 1 покупает единицу продукта у продавца 1, покупатель 2 — у продавца 2, а покупатель 3 покупает единицу продукта у того продавца, у которого цена наименьшая. В случае равенства цен, покупатель 3 покупает у продавца 1.
- Прибыль (выигрыш) продавца равен сумме, полученной от продажи продукта.
- Нужно доказать, что в бескоалиционной игре двух лиц (продавцов) нет ситуаций равновесия.

## Пример 3: «игра цен» (без ситуаций равновесия)

- Имеется 2 продавца одинак. продукта и 3 покупателя.
- Покупатель 1 знаком только с продавцом 1, покупатель 2 — только с продавцом 2, а покупатель 3 знает обоих продавцов.
- Каждому покупателю нужна только одна единица продукта, за которую он готов заплатить максимум 1.
- Продавец  $i \in \{1, 2\}$  назначает цену  $p_i \in [0, 1]$ .
- После этого покупатель 1 покупает единицу продукта у продавца 1, покупатель 2 — у продавца 2, а покупатель 3 покупает единицу продукта у того продавца, у которого цена наименьшая. В случае равенства цен, покупатель 3 покупает у продавца 1.
- Прибыль (выигрыш) продавца равен сумме, полученной от продажи продукта.
- Нужно доказать, что в бескоалиционной игре двух лиц (продавцов) нет ситуаций равновесия.

## Пример 3: «игра цен» (без ситуаций равновесия)

- Имеется 2 продавца одинак. продукта и 3 покупателя.
- Покупатель 1 знаком только с продавцом 1, покупатель 2 — только с продавцом 2, а покупатель 3 знает обоих продавцов.
- Каждому покупателю нужна только одна единица продукта, за которую он готов заплатить максимум 1.
- Продавец  $i \in \{1, 2\}$  назначает цену  $p_i \in [0, 1]$ .
- После этого покупатель 1 покупает единицу продукта у продавца 1, покупатель 2 — у продавца 2, а покупатель 3 покупает единицу продукта у того продавца, у которого цена наименьшая. В случае равенства цен, покупатель 3 покупает у продавца 1.
- Прибыль (выигрыш) продавца равен сумме, полученной от продажи продукта.
- Нужно доказать, что в бескоалиционной игре двух лиц (продавцов) нет ситуаций равновесия.

## Пример 3: «игра цен» (без ситуаций равновесия)

- Имеется 2 продавца одинак. продукта и 3 покупателя.
- Покупатель 1 знаком только с продавцом 1, покупатель 2 — только с продавцом 2, а покупатель 3 знает обоих продавцов.
- Каждому покупателю нужна только одна единица продукта, за которую он готов заплатить максимум 1.
- Продавец  $i \in \{1, 2\}$  назначает цену  $p_i \in [0, 1]$ .
- После этого покупатель 1 покупает единицу продукта у продавца 1, покупатель 2 — у продавца 2, а покупатель 3 покупает единицу продукта у того продавца, у которого цена наименьшая. В случае равенства цен, покупатель 3 покупает у продавца 1.
- Прибыль (выигрыш) продавца равен сумме, полученной от продажи продукта.
- Нужно доказать, что в бескоалиционной игре двух лиц (продавцов) нет ситуаций равновесия.

## Пример 3: «игра цен» (без ситуаций равновесия)

- Имеется 2 продавца одинак. продукта и 3 покупателя.
- Покупатель 1 знаком только с продавцом 1, покупатель 2 — только с продавцом 2, а покупатель 3 знает обоих продавцов.
- **Каждому покупателю нужна только одна единица продукта, за которую он готов заплатить максимум 1.**
- Продавец  $i \in \{1, 2\}$  назначает цену  $p_i \in [0, 1]$ .
- После этого покупатель 1 покупает единицу продукта у продавца 1, покупатель 2 — у продавца 2, а покупатель 3 покупает единицу продукта у того продавца, у которого цена наименьшая. В случае равенства цен, покупатель 3 покупает у продавца 1.
- Прибыль (выигрыш) продавца равен сумме, полученной от продажи продукта.
- Нужно доказать, что в бескоалиционной игре двух лиц (продавцов) нет ситуаций равновесия.

## Пример 3: «игра цен» (без ситуаций равновесия)

- Имеется 2 продавца одинак. продукта и 3 покупателя.
- Покупатель 1 знаком только с продавцом 1, покупатель 2 — только с продавцом 2, а покупатель 3 знает обоих продавцов.
- Каждому покупателю нужна только одна единица продукта, за которую он готов заплатить максимум 1.
- **Продавец  $i \in \{1, 2\}$  назначает цену  $p_i \in [0, 1]$ .**
- После этого покупатель 1 покупает единицу продукта у продавца 1, покупатель 2 — у продавца 2, а покупатель 3 покупает единицу продукта у того продавца, у которого цена наименьшая. В случае равенства цен, покупатель 3 покупает у продавца 1.
- Прибыль (выигрыш) продавца равен сумме, полученной от продажи продукта.
- Нужно доказать, что в бескоалиционной игре двух лиц (продавцов) нет ситуаций равновесия.

## Пример 3: «игра цен» (без ситуаций равновесия)

- Имеется 2 продавца одинак. продукта и 3 покупателя.
- Покупатель 1 знаком только с продавцом 1, покупатель 2 — только с продавцом 2, а покупатель 3 знает обоих продавцов.
- Каждому покупателю нужна только одна единица продукта, за которую он готов заплатить максимум 1.
- Продавец  $i \in \{1, 2\}$  назначает цену  $p_i \in [0, 1]$ .
- После этого покупатель 1 покупает единицу продукта у продавца 1, покупатель 2 — у продавца 2, а покупатель 3 покупает единицу продукта у того продавца, у которого цена наименьшая. В случае равенства цен, покупатель 3 покупает у продавца 1.
- Прибыль (выигрыш) продавца равен сумме, полученной от продажи продукта.
- Нужно доказать, что в бескоалиционной игре двух лиц (продавцов) нет ситуаций равновесия.

## Пример 3: «игра цен» (без ситуаций равновесия)

- Имеется 2 продавца одинак. продукта и 3 покупателя.
- Покупатель 1 знаком только с продавцом 1, покупатель 2 — только с продавцом 2, а покупатель 3 знает обоих продавцов.
- Каждому покупателю нужна только одна единица продукта, за которую он готов заплатить максимум 1.
- Продавец  $i \in \{1, 2\}$  назначает цену  $p_i \in [0, 1]$ .
- После этого покупатель 1 покупает единицу продукта у продавца 1, **покупатель 2 — у продавца 2**, а покупатель 3 покупает единицу продукта у того продавца, у которого цена наименьшая. В случае равенства цен, покупатель 3 покупает у продавца 1.
- Прибыль (выигрыш) продавца равен сумме, полученной от продажи продукта.
- Нужно доказать, что в бескоалиционной игре двух лиц (продавцов) нет ситуаций равновесия.



## Пример 3: «игра цен» (без ситуаций равновесия)

- Имеется 2 продавца одинак. продукта и 3 покупателя.
- Покупатель 1 знаком только с продавцом 1, покупатель 2 — только с продавцом 2, а покупатель 3 знает обоих продавцов.
- Каждому покупателю нужна только одна единица продукта, за которую он готов заплатить максимум 1.
- Продавец  $i \in \{1, 2\}$  назначает цену  $p_i \in [0, 1]$ .
- После этого покупатель 1 покупает единицу продукта у продавца 1, покупатель 2 — у продавца 2, а покупатель 3 покупает единицу продукта у того продавца, у которого цена наименьшая. В случае равенства цен, покупатель 3 покупает у продавца 1.
- Прибыль (выигрыш) продавца равен сумме, полученной от продажи продукта.
- Нужно доказать, что в бескоалиционной игре двух лиц (продавцов) нет ситуаций равновесия.

## Пример 3: «игра цен» (без ситуаций равновесия)

- Имеется 2 продавца одинак. продукта и 3 покупателя.
- Покупатель 1 знаком только с продавцом 1, покупатель 2 — только с продавцом 2, а покупатель 3 знает обоих продавцов.
- Каждому покупателю нужна только одна единица продукта, за которую он готов заплатить максимум 1.
- Продавец  $i \in \{1, 2\}$  назначает цену  $p_i \in [0, 1]$ .
- После этого покупатель 1 покупает единицу продукта у продавца 1, покупатель 2 — у продавца 2, а покупатель 3 покупает единицу продукта у того продавца, у которого цена наименьшая. **В случае равенства цен, покупатель 3 покупает у продавца 1.**
- Прибыль (выигрыш) продавца равен сумме, полученной от продажи продукта.
- Нужно доказать, что в бескоалиционной игре двух лиц (продавцов) нет ситуаций равновесия.

## Пример 3: «игра цен» (без ситуаций равновесия)

- Имеется 2 продавца одинак. продукта и 3 покупателя.
- Покупатель 1 знаком только с продавцом 1, покупатель 2 — только с продавцом 2, а покупатель 3 знает обоих продавцов.
- Каждому покупателю нужна только одна единица продукта, за которую он готов заплатить максимум 1.
- Продавец  $i \in \{1, 2\}$  назначает цену  $p_i \in [0, 1]$ .
- После этого покупатель 1 покупает единицу продукта у продавца 1, покупатель 2 — у продавца 2, а покупатель 3 покупает единицу продукта у того продавца, у которого цена наименьшая. В случае равенства цен, покупатель 3 покупает у продавца 1.
- **Прибыль (выигрыш) продавца равен сумме, полученной от продажи продукта.**
- Нужно доказать, что в бескоалиционной игре двух лиц (продавцов) нет ситуаций равновесия.

## Пример 3: «игра цен» (без ситуаций равновесия)

- Имеется 2 продавца одинак. продукта и 3 покупателя.
- Покупатель 1 знаком только с продавцом 1, покупатель 2 — только с продавцом 2, а покупатель 3 знает обоих продавцов.
- Каждому покупателю нужна только одна единица продукта, за которую он готов заплатить максимум 1.
- Продавец  $i \in \{1, 2\}$  назначает цену  $p_i \in [0, 1]$ .
- После этого покупатель 1 покупает единицу продукта у продавца 1, покупатель 2 — у продавца 2, а покупатель 3 покупает единицу продукта у того продавца, у которого цена наименьшая. В случае равенства цен, покупатель 3 покупает у продавца 1.
- Прибыль (выигрыш) продавца равен сумме, полученной от продажи продукта.
- **Нужно доказать, что в бескоалиционной игре двух лиц (продавцов) нет ситуаций равновесия.**

## Пример 3: анализ «игры цен»

- Здесь  $N = \{1, 2\}$ ,  $S_1 = S_2 = [0, 1]$ .
- В ситуации  $p = (p_1, p_2) \in [0, 1]^2$  выигрыши игроков определяются по правилу:

$$\phi_1(p_1, p_2) = \begin{cases} 2p_1, & \text{если } p_1 \leq p_2, \\ p_1, & \text{если } p_1 > p_2, \end{cases}$$

$$\phi_2(p_1, p_2) = \begin{cases} 2p_2, & \text{если } p_1 > p_2, \\ p_2, & \text{если } p_1 \leq p_2. \end{cases}$$

- Если  $p_1 \leq 1/2$ , то наилучшим ответом игрока 2 будет цена  $p_2 = 1$ . Тогда игроку 1 также нужно назначить цену 1, чтобы увеличить свой выигрыш с  $2p_1 \leq 1$  до 2.
- Если же  $p_1 > 1/2$ , то игрок 2 должен назначит цену  $p_2$ , «чуть меньшую»  $p_1$ , т. е.  $1/2 < p_2 < p_1$ . Но тогда игрок 1, назначая цену  $\bar{p}_1 = p_2$ , увеличит свой выигрыш:  $\phi_1(\bar{p}_1, p_2) = 2\bar{p}_1 = 2p_2 > 1 \geq p_1 = \phi_1(p_1, p_2)$ .

## Пример 3: анализ «игры цен»

- Здесь  $N = \{1, 2\}$ ,  $S_1 = S_2 = [0, 1]$ .
- В ситуации  $p = (p_1, p_2) \in [0, 1]^2$  выигрыши игроков определяются по правилу:

$$\phi_1(p_1, p_2) = \begin{cases} 2p_1, & \text{если } p_1 \leq p_2, \\ p_1, & \text{если } p_1 > p_2, \end{cases}$$

$$\phi_2(p_1, p_2) = \begin{cases} 2p_2, & \text{если } p_1 > p_2, \\ p_2, & \text{если } p_1 \leq p_2. \end{cases}$$

- Если  $p_1 \leq 1/2$ , то наилучшим ответом игрока 2 будет цена  $p_2 = 1$ . Тогда игроку 1 также нужно назначить цену 1, чтобы увеличить свой выигрыш с  $2p_1 \leq 1$  до 2.
- Если же  $p_1 > 1/2$ , то игрок 2 должен назначит цену  $p_2$ , «чуть меньшую»  $p_1$ , т. е.  $1/2 < p_2 < p_1$ . Но тогда игрок 1, назначая цену  $\bar{p}_1 = p_2$ , увеличит свой выигрыш:  $\phi_1(\bar{p}_1, p_2) = 2\bar{p}_1 = 2p_2 > 1 \geq p_1 = \phi_1(p_1, p_2)$ .

## Пример 3: анализ «игры цен»

- Здесь  $N = \{1, 2\}$ ,  $S_1 = S_2 = [0, 1]$ .
- В ситуации  $p = (p_1, p_2) \in [0, 1]^2$  выигрыши игроков определяются по правилу:

$$\phi_1(p_1, p_2) = \begin{cases} 2p_1, & \text{если } p_1 \leq p_2, \\ p_1, & \text{если } p_1 > p_2, \end{cases}$$

$$\phi_2(p_1, p_2) = \begin{cases} 2p_2, & \text{если } p_1 > p_2, \\ p_2, & \text{если } p_1 \leq p_2. \end{cases}$$

- Если  $p_1 \leq 1/2$ , то наилучшим ответом игрока 2 будет цена  $p_2 = 1$ . Тогда игроку 1 также нужно назначить цену 1, чтобы увеличить свой выигрыш с  $2p_1 \leq 1$  до 2.
- Если же  $p_1 > 1/2$ , то игрок 2 должен назначит цену  $p_2$ , «чуть меньшую»  $p_1$ , т. е.  $1/2 < p_2 < p_1$ . Но тогда игрок 1, назначая цену  $\bar{p}_1 = p_2$ , увеличит свой выигрыш:  $\phi_1(\bar{p}_1, p_2) = 2\bar{p}_1 = 2p_2 > 1 \geq p_1 = \phi_1(p_1, p_2)$ .

## Пример 3: анализ «игры цен»

- Здесь  $N = \{1, 2\}$ ,  $S_1 = S_2 = [0, 1]$ .
- В ситуации  $p = (p_1, p_2) \in [0, 1]^2$  выигрыши игроков определяются по правилу:

$$\phi_1(p_1, p_2) = \begin{cases} 2p_1, & \text{если } p_1 \leq p_2, \\ p_1, & \text{если } p_1 > p_2, \end{cases}$$

$$\phi_2(p_1, p_2) = \begin{cases} 2p_2, & \text{если } p_1 > p_2, \\ p_2, & \text{если } p_1 \leq p_2. \end{cases}$$

- Если  $p_1 \leq 1/2$ , то наилучшим ответом игрока 2 будет цена  $p_2 = 1$ . Тогда игроку 1 также нужно назначить цену 1, чтобы увеличить свой выигрыш с  $2p_1 \leq 1$  до 2.
- Если же  $p_1 > 1/2$ , то игрок 2 должен назначит цену  $p_2$ , «чуть меньшую»  $p_1$ , т. е.  $1/2 < p_2 < p_1$ . Но тогда игрок 1, назначая цену  $\bar{p}_1 = p_2$ , увеличит свой выигрыш:  $\phi_1(\bar{p}_1, p_2) = 2\bar{p}_1 = 2p_2 > 1 \geq p_1 = \phi_1(p_1, p_2)$ .



## Пример 3: анализ «игры цен»

- Здесь  $N = \{1, 2\}$ ,  $S_1 = S_2 = [0, 1]$ .
- В ситуации  $p = (p_1, p_2) \in [0, 1]^2$  выигрыши игроков определяются по правилу:

$$\phi_1(p_1, p_2) = \begin{cases} 2p_1, & \text{если } p_1 \leq p_2, \\ p_1, & \text{если } p_1 > p_2, \end{cases}$$

$$\phi_2(p_1, p_2) = \begin{cases} 2p_2, & \text{если } p_1 > p_2, \\ p_2, & \text{если } p_1 \leq p_2. \end{cases}$$

- Если  $p_1 \leq 1/2$ , то наилучшим ответом игрока 2 будет цена  $p_2 = 1$ . Тогда игроку 1 также нужно назначить цену 1, чтобы увеличить свой выигрыш с  $2p_1 \leq 1$  до 2.
- Если же  $p_1 > 1/2$ , то игрок 2 должен назначит цену  $p_2$ , «чуть меньшую»  $p_1$ , т. е.  $1/2 < p_2 < p_1$ . Но тогда игрок 1, назначая цену  $\bar{p}_1 = p_2$ , увеличит свой выигрыш:  $\phi_1(\bar{p}_1, p_2) = 2\bar{p}_1 = 2p_2 > 1 \geq p_1 = \phi_1(p_1, p_2)$ .

## Пример 3: анализ «игры цен»

- Здесь  $N = \{1, 2\}$ ,  $S_1 = S_2 = [0, 1]$ .
- В ситуации  $p = (p_1, p_2) \in [0, 1]^2$  выигрыши игроков определяются по правилу:

$$\phi_1(p_1, p_2) = \begin{cases} 2p_1, & \text{если } p_1 \leq p_2, \\ p_1, & \text{если } p_1 > p_2, \end{cases}$$

$$\phi_2(p_1, p_2) = \begin{cases} 2p_2, & \text{если } p_1 > p_2, \\ p_2, & \text{если } p_1 \leq p_2. \end{cases}$$

- Если  $p_1 \leq 1/2$ , то наилучшим ответом игрока 2 будет цена  $p_2 = 1$ . Тогда игроку 1 также нужно назначить цену 1, чтобы увеличить свой выигрыш с  $2p_1 \leq 1$  до 2.
- Если же  $p_1 > 1/2$ , то игрок 2 должен назначит цену  $p_2$ , «чуть меньшую»  $p_1$ , т. е.  $1/2 < p_2 < p_1$ . Но тогда игрок 1, назначая цену  $\bar{p}_1 = p_2$ , увеличит свой выигрыш:  $\phi_1(\bar{p}_1, p_2) = 2\bar{p}_1 = 2p_2 > 1 \geq p_1 = \phi_1(p_1, p_2)$ .

## Пример 3: анализ «игры цен»

- Здесь  $N = \{1, 2\}$ ,  $S_1 = S_2 = [0, 1]$ .
- В ситуации  $p = (p_1, p_2) \in [0, 1]^2$  выигрыши игроков определяются по правилу:

$$\phi_1(p_1, p_2) = \begin{cases} 2p_1, & \text{если } p_1 \leq p_2, \\ p_1, & \text{если } p_1 > p_2, \end{cases}$$

$$\phi_2(p_1, p_2) = \begin{cases} 2p_2, & \text{если } p_1 > p_2, \\ p_2, & \text{если } p_1 \leq p_2. \end{cases}$$

- Если  $p_1 \leq 1/2$ , то наилучшим ответом игрока 2 будет цена  $p_2 = 1$ . Тогда игроку 1 также нужно назначить цену 1, чтобы увеличить свой выигрыш с  $2p_1 \leq 1$  до 2.
- Если же  $p_1 > 1/2$ , то игрок 2 должен назначит цену  $p_2$ , «чуть меньшую»  $p_1$ , т. е.  $1/2 < p_2 < p_1$ . Но тогда игрок 1, назначая цену  $\bar{p}_1 = p_2$ , увеличит свой выигрыш:  $\phi_1(\bar{p}_1, p_2) = 2\bar{p}_1 = 2p_2 > 1 \geq p_1 = \phi_1(p_1, p_2)$ .

## Пример 3: анализ «игры цен»

- Здесь  $N = \{1, 2\}$ ,  $S_1 = S_2 = [0, 1]$ .
- В ситуации  $p = (p_1, p_2) \in [0, 1]^2$  выигрыши игроков определяются по правилу:

$$\phi_1(p_1, p_2) = \begin{cases} 2p_1, & \text{если } p_1 \leq p_2, \\ p_1, & \text{если } p_1 > p_2, \end{cases}$$

$$\phi_2(p_1, p_2) = \begin{cases} 2p_2, & \text{если } p_1 > p_2, \\ p_2, & \text{если } p_1 \leq p_2. \end{cases}$$

- Если  $p_1 \leq 1/2$ , то наилучшим ответом игрока 2 будет цена  $p_2 = 1$ . Тогда игроку 1 также нужно назначить цену 1, чтобы увеличить свой выигрыш с  $2p_1 \leq 1$  до 2.
- Если же  $p_1 > 1/2$ , то игрок 2 должен назначит цену  $p_2$ , «чуть меньшую»  $p_1$ , т. е.  $1/2 < p_2 < p_1$ . Но тогда игрок 1, назначая цену  $\bar{p}_1 = p_2$ , увеличит свой выигрыш:  $\phi_1(\bar{p}_1, p_2) = 2\bar{p}_1 = 2p_2 > 1 \geq p_1 = \phi_1(p_1, p_2)$ .

# Содержание

- 1 Бескоалиционные игры, равновесие Нэша
  - Стратегическая форма бескоалиционной игры
  - Примеры бескоалиционных игр
  - Доминирование
- 2 Выпуклые игры
  - Теорема Нэша
  - Итерационный алгоритм решения выпуклых игр
- 3 Конечные бескоалиционные игры
  - Смешанные стратегии
  - Равновесие в смешанных стратегиях

# Доминирующие стратегии

- Стратегия  $\bar{s}_i \in S_i$  *доминирует* стратегию  $\hat{s}_i \in S_i$  игрока  $i$ , если

$$\phi_i(\bar{s}_i, s_{-i}) \geq \phi_i(\hat{s}_i, s_{-i}) \quad \text{для всех } s_{-i} \in S_{-i},$$

- Стратегия  $\hat{s}_i \in S_i$  называется *доминируемой*, если существует стратегия  $\bar{s}_i \in S_i$ , которая доминирует  $\hat{s}_i$ .
- Стратегия  $\bar{s}_i \in S_i$  является *доминирующей стратегией* игрока  $i$ , если она доминирует все его стратегии:

$$\phi_i(\bar{s}_i, s_{-i}) \geq \phi_i(\hat{s}_i, s_{-i}) \quad \text{для всех } \hat{s}_i \in S_i, s_{-i} \in S_{-i}.$$

- Если в игре у каждого игрока есть доминирующая стратегия, то ситуация, составленная из этих доминирующих стратегий, называется *доминирующим равновесием*.
- По определению, доминирующее равновесие является ситуацией равновесия Нэша, но обратное в общем случае не верно.

# Доминирующие стратегии

- Стратегия  $\bar{s}_i \in S_i$  *доминирует* стратегию  $\hat{s}_i \in S_i$  игрока  $i$ , если

$$\phi_i(\bar{s}_i, s_{-i}) \geq \phi_i(\hat{s}_i, s_{-i}) \quad \text{для всех } s_{-i} \in S_{-i},$$

- Стратегия  $\hat{s}_i \in S_i$  называется *доминируемой*, если существует стратегия  $\bar{s}_i \in S_i$ , которая доминирует  $\hat{s}_i$ .
- Стратегия  $\bar{s}_i \in S_i$  является *доминирующей стратегией* игрока  $i$ , если она доминирует все его стратегии:

$$\phi_i(\bar{s}_i, s_{-i}) \geq \phi_i(\hat{s}_i, s_{-i}) \quad \text{для всех } \hat{s}_i \in S_i, s_{-i} \in S_{-i}.$$

- Если в игре у каждого игрока есть доминирующая стратегия, то ситуация, составленная из этих доминирующих стратегий, называется *доминирующим равновесием*.
- По определению, доминирующее равновесие является ситуацией равновесия Нэша, но обратное в общем случае не верно.

# Доминирующие стратегии

- Стратегия  $\bar{s}_i \in S_i$  *доминирует* стратегию  $\hat{s}_i \in S_i$  игрока  $i$ , если

$$\phi_i(\bar{s}_i, s_{-i}) \geq \phi_i(\hat{s}_i, s_{-i}) \quad \text{для всех } s_{-i} \in S_{-i},$$

- Стратегия  $\hat{s}_i \in S_i$  называется *доминируемой*, если существует стратегия  $\bar{s}_i \in S_i$ , которая доминирует  $\hat{s}_i$ .
- Стратегия  $\bar{s}_i \in S_i$  является *доминирующей стратегией* игрока  $i$ , если она доминирует все его стратегии:

$$\phi_i(\bar{s}_i, s_{-i}) \geq \phi_i(\hat{s}_i, s_{-i}) \quad \text{для всех } \hat{s}_i \in S_i, s_{-i} \in S_{-i}.$$

- Если в игре у каждого игрока есть доминирующая стратегия, то ситуация, составленная из этих доминирующих стратегий, называется *доминирующим равновесием*.
- По определению, доминирующее равновесие является ситуацией равновесия Нэша, но обратное в общем случае не верно.



# Доминирующие стратегии

- Стратегия  $\bar{s}_i \in S_i$  *доминирует* стратегию  $\hat{s}_i \in S_i$  игрока  $i$ , если

$$\phi_i(\bar{s}_i, s_{-i}) \geq \phi_i(\hat{s}_i, s_{-i}) \quad \text{для всех } s_{-i} \in S_{-i},$$

- Стратегия  $\hat{s}_i \in S_i$  называется *доминируемой*, если существует стратегия  $\bar{s}_i \in S_i$ , которая доминирует  $\hat{s}_i$ .
- Стратегия  $\bar{s}_i \in S_i$  является *доминирующей стратегией* игрока  $i$ , если она доминирует все его стратегии:

$$\phi_i(\bar{s}_i, s_{-i}) \geq \phi_i(\hat{s}_i, s_{-i}) \quad \text{для всех } \hat{s}_i \in S_i, s_{-i} \in S_{-i}.$$

- Если в игре у каждого игрока есть доминирующая стратегия, то ситуация, составленная из этих доминирующих стратегий, называется *доминирующим равновесием*.
- По определению, доминирующее равновесие является ситуацией равновесия Нэша, но обратное в общем случае не верно.

# Доминирующие стратегии

- Стратегия  $\bar{s}_i \in S_i$  *доминирует* стратегию  $\hat{s}_i \in S_i$  игрока  $i$ , если

$$\phi_i(\bar{s}_i, s_{-i}) \geq \phi_i(\hat{s}_i, s_{-i}) \quad \text{для всех } s_{-i} \in S_{-i},$$

- Стратегия  $\hat{s}_i \in S_i$  называется *доминируемой*, если существует стратегия  $\bar{s}_i \in S_i$ , которая доминирует  $\hat{s}_i$ .
- Стратегия  $\bar{s}_i \in S_i$  является *доминирующей стратегией* игрока  $i$ , если она доминирует все его стратегии:

$$\phi_i(\bar{s}_i, s_{-i}) \geq \phi_i(\hat{s}_i, s_{-i}) \quad \text{для всех } \hat{s}_i \in S_i, s_{-i} \in S_{-i}.$$

- Если в игре у каждого игрока есть доминирующая стратегия, то ситуация, составленная из этих доминирующих стратегий, называется *доминирующим равновесием*.
- По определению, доминирующее равновесие является ситуацией равновесия Нэша, но обратное в общем случае не верно.

# Доминирующие стратегии

- Стратегия  $\bar{s}_i \in S_i$  *доминирует* стратегию  $\hat{s}_i \in S_i$  игрока  $i$ , если

$$\phi_i(\bar{s}_i, s_{-i}) \geq \phi_i(\hat{s}_i, s_{-i}) \quad \text{для всех } s_{-i} \in S_{-i},$$

- Стратегия  $\hat{s}_i \in S_i$  называется *доминируемой*, если существует стратегия  $\bar{s}_i \in S_i$ , которая доминирует  $\hat{s}_i$ .
- Стратегия  $\bar{s}_i \in S_i$  является *доминирующей стратегией* игрока  $i$ , если она доминирует все его стратегии:

$$\phi_i(\bar{s}_i, s_{-i}) \geq \phi_i(\hat{s}_i, s_{-i}) \quad \text{для всех } \hat{s}_i \in S_i, s_{-i} \in S_{-i}.$$

- Если в игре у каждого игрока есть доминирующая стратегия, то ситуация, составленная из этих доминирующих стратегий, называется *доминирующим равновесием*.
- По определению, доминирующее равновесие является ситуацией равновесия Нэша, но обратное в общем случае не верно.

# Доминирующие стратегии

- Стратегия  $\bar{s}_i \in S_i$  *доминирует* стратегию  $\hat{s}_i \in S_i$  игрока  $i$ , если

$$\phi_i(\bar{s}_i, s_{-i}) \geq \phi_i(\hat{s}_i, s_{-i}) \quad \text{для всех } s_{-i} \in S_{-i},$$

- Стратегия  $\hat{s}_i \in S_i$  называется *доминируемой*, если существует стратегия  $\bar{s}_i \in S_i$ , которая доминирует  $\hat{s}_i$ .
- Стратегия  $\bar{s}_i \in S_i$  является *доминирующей стратегией* игрока  $i$ , если она доминирует все его стратегии:

$$\phi_i(\bar{s}_i, s_{-i}) \geq \phi_i(\hat{s}_i, s_{-i}) \quad \text{для всех } \hat{s}_i \in S_i, s_{-i} \in S_{-i}.$$

- Если в игре у каждого игрока есть доминирующая стратегия, то ситуация, составленная из этих доминирующих стратегий, называется *доминирующим равновесием*.
- По определению, доминирующее равновесие является ситуацией равновесия Нэша, но обратное в общем случае не верно.

# Доминирующие стратегии

- Стратегия  $\bar{s}_i \in S_i$  *доминирует* стратегию  $\hat{s}_i \in S_i$  игрока  $i$ , если

$$\phi_i(\bar{s}_i, s_{-i}) \geq \phi_i(\hat{s}_i, s_{-i}) \quad \text{для всех } s_{-i} \in S_{-i},$$

- Стратегия  $\hat{s}_i \in S_i$  называется *доминируемой*, если существует стратегия  $\bar{s}_i \in S_i$ , которая доминирует  $\hat{s}_i$ .
- Стратегия  $\bar{s}_i \in S_i$  является *доминирующей стратегией* игрока  $i$ , если она доминирует все его стратегии:

$$\phi_i(\bar{s}_i, s_{-i}) \geq \phi_i(\hat{s}_i, s_{-i}) \quad \text{для всех } \hat{s}_i \in S_i, s_{-i} \in S_{-i}.$$

- Если в игре у каждого игрока есть доминирующая стратегия, **то ситуация, составленная из этих доминирующих стратегий, называется доминирующим равновесием.**
- По определению, доминирующее равновесие является ситуацией равновесия Нэша, но обратное в общем случае не верно.

# Доминирующие стратегии

- Стратегия  $\bar{s}_i \in S_i$  *доминирует* стратегию  $\hat{s}_i \in S_i$  игрока  $i$ , если

$$\phi_i(\bar{s}_i, s_{-i}) \geq \phi_i(\hat{s}_i, s_{-i}) \quad \text{для всех } s_{-i} \in S_{-i},$$

- Стратегия  $\hat{s}_i \in S_i$  называется *доминируемой*, если существует стратегия  $\bar{s}_i \in S_i$ , которая доминирует  $\hat{s}_i$ .
- Стратегия  $\bar{s}_i \in S_i$  является *доминирующей стратегией* игрока  $i$ , если она доминирует все его стратегии:

$$\phi_i(\bar{s}_i, s_{-i}) \geq \phi_i(\hat{s}_i, s_{-i}) \quad \text{для всех } \hat{s}_i \in S_i, s_{-i} \in S_{-i}.$$

- Если в игре у каждого игрока есть доминирующая стратегия, то ситуация, составленная из этих доминирующих стратегий, называется *доминирующим равновесием*.
- По определению, доминирующее равновесие является ситуацией равновесия Нэша, но обратное в общем случае не верно.

# Доминирующие стратегии

- Стратегия  $\bar{s}_i \in S_i$  *доминирует* стратегию  $\hat{s}_i \in S_i$  игрока  $i$ , если

$$\phi_i(\bar{s}_i, s_{-i}) \geq \phi_i(\hat{s}_i, s_{-i}) \quad \text{для всех } s_{-i} \in S_{-i},$$

- Стратегия  $\hat{s}_i \in S_i$  называется *доминируемой*, если существует стратегия  $\bar{s}_i \in S_i$ , которая доминирует  $\hat{s}_i$ .
- Стратегия  $\bar{s}_i \in S_i$  является *доминирующей стратегией* игрока  $i$ , если она доминирует все его стратегии:

$$\phi_i(\bar{s}_i, s_{-i}) \geq \phi_i(\hat{s}_i, s_{-i}) \quad \text{для всех } \hat{s}_i \in S_i, s_{-i} \in S_{-i}.$$

- Если в игре у каждого игрока есть доминирующая стратегия, то ситуация, составленная из этих доминирующих стратегий, называется *доминирующим равновесием*.
- По определению, доминирующее равновесие является ситуацией равновесия Нэша, **но обратное в общем случае не верно.**

# Удаление доминируемых стратегий

- Игры, в которых имеется доминирующее равновесие, встречаются не часто.
- Но концепцию доминирования можно также использовать для упрощения решаемой игры.
- В любой ситуации  $s$  игрок  $i$  ничего не потеряет (а может даже и выиграет), переходя от доминируемой стратегии  $s_i$  к стратегии  $\bar{s}_i$ , доминирующей  $s_i$ .
- Поэтому если каждый игрок удалит из своего множества стратегий все доминируемые стратегии, то в результате получится эквивалентная *усеченная игра*.
- Для этой усеченной игры снова можно построить новую усеченную игру.
- И этот итерационный процесс можно продолжать до тех пор, пока ни у одного из игроков не будет доминируемых стратегий.



# Удаление доминируемых стратегий

- Игры, в которых имеется доминирующее равновесие, встречаются не часто.
- Но концепцию доминирования можно также использовать для упрощения решаемой игры.
- В любой ситуации  $s$  игрок  $i$  ничего не потеряет (а может даже и выиграет), переходя от доминируемой стратегии  $s_i$  к стратегии  $\bar{s}_i$ , доминирующей  $s_i$ .
- Поэтому если каждый игрок удалит из своего множества стратегий все доминируемые стратегии, то в результате получится эквивалентная *усеченная игра*.
- Для этой усеченной игры снова можно построить новую усеченную игру.
- И этот итерационный процесс можно продолжать до тех пор, пока ни у одного из игроков не будет доминируемых стратегий.

# Удаление доминируемых стратегий

- Игры, в которых имеется доминирующее равновесие, встречаются не часто.
- Но концепцию доминирования можно также использовать для упрощения решаемой игры.
- В любой ситуации  $s$  игрок  $i$  ничего не потеряет (а может даже и выиграет), переходя от доминируемой стратегии  $s_i$  к стратегии  $\bar{s}_i$ , доминирующей  $s_i$ .
- Поэтому если каждый игрок удалит из своего множества стратегий все доминируемые стратегии, то в результате получится эквивалентная *усеченная игра*.
- Для этой усеченной игры снова можно построить новую усеченную игру.
- И этот итерационный процесс можно продолжать до тех пор, пока ни у одного из игроков не будет доминируемых стратегий.

# Удаление доминируемых стратегий

- Игры, в которых имеется доминирующее равновесие, встречаются не часто.
- Но концепцию доминирования можно также использовать для упрощения решаемой игры.
- В любой ситуации  $s$  игрок  $i$  ничего не потеряет (а может даже и выиграет), переходя от доминируемой стратегии  $s_i$  к стратегии  $\bar{s}_i$ , доминирующей  $s_i$ .
- Поэтому если каждый игрок удалит из своего множества стратегий все доминируемые стратегии, то в результате получится эквивалентная *усеченная игра*.
- Для этой усеченной игры снова можно построить новую усеченную игру.
- И этот итерационный процесс можно продолжать до тех пор, пока ни у одного из игроков не будет доминируемых стратегий.

# Удаление доминируемых стратегий

- Игры, в которых имеется доминирующее равновесие, встречаются не часто.
- Но концепцию доминирования можно также использовать для упрощения решаемой игры.
- В любой ситуации  $s$  игрок  $i$  ничего не потеряет (а может даже и выиграет), переходя от доминируемой стратегии  $s_i$  к стратегии  $\bar{s}_i$ , доминирующей  $s_i$ .
- Поэтому если каждый игрок удалит из своего множества стратегий все доминируемые стратегии, то в результате получится эквивалентная *усеченная игра*.
- Для этой усеченной игры снова можно построить новую усеченную игру.
- И этот итерационный процесс можно продолжать до тех пор, пока ни у одного из игроков не будет доминируемых стратегий.

# Удаление доминируемых стратегий

- Игры, в которых имеется доминирующее равновесие, встречаются не часто.
- Но концепцию доминирования можно также использовать для упрощения решаемой игры.
- В любой ситуации  $s$  игрок  $i$  ничего не потеряет (а может даже и выиграет), переходя от доминируемой стратегии  $s_i$  к стратегии  $\bar{s}_i$ , доминирующей  $s_i$ .
- Поэтому если каждый игрок удалит из своего множества стратегий все доминируемые стратегии, то в результате получится эквивалентная *усеченная игра*.
- Для этой усеченной игры снова можно построить новую усеченную игру.
- И этот итерационный процесс можно продолжать до тех пор, пока ни у одного из игроков не будет доминируемых стратегий.

# Пример 1: продолжение

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

Игрок 3

		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

Игрок 3

		1	2
Игрок 2	1	(1, 5, 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

- В каждой тройке чисел табл. 1 первое число не превосходит первого числа в соотв. тройке чисел табл. 2.
- Стратегия 2 игрока 1 доминирует его стратегию 1.
- После удаления страт. 1 игрока 1 мы получим усеченную игру игроков 2 и 3.

# Пример 1: продолжение

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

Игрок 3

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

Игрок 3

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 5, 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

- В каждой тройке чисел табл. 1 первое число не превосходит первого числа в соотв. тройке чисел табл. 2.
- Стратегия 2 игрока 1 доминирует его стратегию 1.
- После удаления страт. 1 игрока 1 мы получим усеченную игру игроков 2 и 3.

# Пример 1: продолжение

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

Игрок 3

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

Игрок 3

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 5, 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

- В каждой тройке чисел табл. 1 первое число не превосходит первого числа в соотв. тройке чисел табл. 2.
- Стратегия 2 игрока 1 доминирует его стратегию 1.
- После удаления страт. 1 игрока 1 мы получим усеченную игру игроков 2 и 3.



# Пример 1: продолжение

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(5, 5)	(1, 0)
	2	(0, 1)	(1, 1)

- В каждой тройке чисел табл. 1 первое число не превосходит первого числа в соотв. тройке чисел табл. 2.
- Стратегия 2 игрока 1 доминирует его стратегию 1.
- После удаления страт. 1 игрока 1 мы получим усеченную игру игроков 2 и 3.

# Пример 1: продолжение

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(5, 5)	(1, 0)
	2	(0, 1)	(1, 1)

- В усеченной игре, стратегия 1 у каждого из игроков доминирует его стратегию 2.
- Поэтому (1, 1) есть доминирующая ситуация равновесия для усеченной игры.
- Следовательно, (2, 1, 1) есть ситуация равновесия в исходной игре.

# Пример 1: продолжение

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(5, 5)	(1, 0)
	2	(0, 1)	(1, 1)

- В усеченной игре, стратегия 1 у каждого из игроков доминирует его стратегию 2.
- Поэтому (1, 1) есть доминирующая ситуация равновесия для усеченной игры.
- Следовательно, (2, 1, 1) есть ситуация равновесия в исходной игре.

## Пример 1: продолжение

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(5, 5)	(1, 0)
	2	(0, 1)	(1, 1)

- В усеченной игре, стратегия 1 у каждого из игроков доминирует его стратегию 2.
- Поэтому (1, 1) есть доминирующая ситуация равновесия для усеченной игры.
- Следовательно, (2, 1, 1) есть ситуация равновесия в исходной игре.

# Пример 1: продолжение

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

Игрок 3

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

Игрок 3

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 5, 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

- Заметим, что ситуация  $(2, 1, 1)$  не является доминирующим равновесием в исходной игре,
- поскольку стратегия 1 не является доминирующей для игрока 2.

# Пример 1: продолжение

Игрок 1 выбирает стратегию 1:

Игрок 3

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 6, 3)	(2, 0, 5)
	2	(1, 8, 1)	(3, 6, 2)

Игрок 1 выбирает стратегию 2:

Игрок 3

		Игрок 3	
		1	2
Игрок 2	1	(1, 5, 5)	(2, 1, 0)
	2	(2, 0, 1)	(4, 1, 1)

- Заметим, что ситуация  $(2, 1, 1)$  не является доминирующим равновесием в исходной игре,
- поскольку стратегия 1 не является доминирующей для игрока 2.

# Выпуклые игры

## Определение

Бескоалиционная игра  $\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N})$

называется *выпуклой игрой*, если

для всех  $i \in N = \{1, \dots, n\}$  выполняются условия:

- 1  $S_i$  — выпуклый компакт в  $\mathbb{R}^{n_i}$ ;
- 2  $\phi_i(s)$  — непрерывная на  $S = \prod_{i=1}^n S_i$  функция;
- 3 для всех фиксированных  $s_{-i} \in S_{-i}$  функция  $\phi_i(s_i, s_{-i})$  — квазивогнута по переменной  $s_i$ .

# Выпуклые игры

## Определение

Бескоалиционная игра  $\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N})$

называется *выпуклой игрой*, если

для всех  $i \in N = \{1, \dots, n\}$  выполняются условия:

- 1  $S_i$  — выпуклый компакт в  $\mathbb{R}^{n_i}$ ;
- 2  $\phi_i(s)$  — непрерывная на  $S = \prod_{i=1}^n S_i$  функция;
- 3 для всех фиксированных  $s_{-i} \in S_{-i}$  функция  $\phi_i(s_i, s_{-i})$  — квазивогнута по переменной  $s_i$ .



# Выпуклые игры

## Определение

Бескоалиционная игра  $\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N})$

называется *выпуклой игрой*, если

для всех  $i \in N = \{1, \dots, n\}$  выполняются условия:

- 1  $S_i$  — выпуклый компакт в  $\mathbb{R}^{n_i}$ ;
- 2  $\phi_i(s)$  — непрерывная на  $S = \prod_{i=1}^n S_i$  функция;
- 3 для всех фиксированных  $s_{-i} \in S_{-i}$  функция  $\phi_i(s_i, s_{-i})$  — квазивогнута по переменной  $s_i$ .

# Выпуклые игры

## Определение

Бескоалиционная игра  $\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N})$

называется *выпуклой игрой*, если

для всех  $i \in N = \{1, \dots, n\}$  выполняются условия:

- 1  $S_i$  — выпуклый компакт в  $\mathbb{R}^{n_i}$ ;
- 2  $\phi_i(s)$  — непрерывная на  $S = \prod_{i=1}^n S_i$  функция;
- 3 для всех фиксированных  $s_{-i} \in S_{-i}$  функция  $\phi_i(s_i, s_{-i})$  — квазивогнута по переменной  $s_i$ .

# Содержание

- 1 Бескоалиционные игры, равновесие Нэша
  - Стратегическая форма бескоалиционной игры
  - Примеры бескоалиционных игр
  - Доминирование
  
- 2 Выпуклые игры
  - Теорема Нэша
  - Итерационный алгоритм решения выпуклых игр
  
- 3 Конечные бескоалиционные игры
  - Смешанные стратегии
  - Равновесие в смешанных стратегиях

# Теорема о существовании равновесия

## Теорема (Нэша)

*Любая выпуклая игра имеет хотя бы одну ситуацию равновесия.*

▶ [Перейти к доказательству](#)

# «Проклятие общего»

## Пример

- Предположим, что  $n$  ( $n > 4$ ) интернет провайдеров (в дальнейшем игроков) безконтрольно делят общий внешний канал выхода в интернет емкости 1.
- Игрок  $i \in N \stackrel{\text{def}}{=} \{1, \dots, n\}$  выбирает свою стратегию  $x_i \in S_i \stackrel{\text{def}}{=} [0, 1]$ ,
- и в ситуации  $x = (x_1, \dots, x_n)$  игрок  $i$  выигрывает 
$$\phi_i(x) = x_i \left( 1 - \sum_{j=1}^n x_j \right).$$
- Нужно найти ситуацию равновесия
- и сравнить выигрыши игроков в ситуации равновесия с теми, которые игроки могут получить, если договорятся пропорционально разделить половину емкости канала.

# «Проклятие общего»

## Пример

- Предположим, что  $n$  ( $n > 4$ ) интернет провайдеров (в дальнейшем игроков) безконтрольно делят общий внешний канал выхода в интернет емкости 1.
- Игрок  $i \in N \stackrel{\text{def}}{=} \{1, \dots, n\}$  выбирает свою стратегию  $x_i \in S_i \stackrel{\text{def}}{=} [0, 1]$ ,
- и в ситуации  $x = (x_1, \dots, x_n)$  игрок  $i$  выигрывает 
$$\phi_i(x) = x_i \left( 1 - \sum_{j=1}^n x_j \right).$$
- Нужно найти ситуацию равновесия
- и сравнить выигрыши игроков в ситуации равновесия с теми, которые игроки могут получить, если договорятся пропорционально разделить половину емкости канала.

# «Проклятие общего»

## Пример

- Предположим, что  $n$  ( $n > 4$ ) интернет провайдеров (в дальнейшем игроков) безконтрольно делят общий внешний канал выхода в интернет емкости 1.
- Игрок  $i \in N \stackrel{\text{def}}{=} \{1, \dots, n\}$  выбирает свою стратегию  $x_i \in S_i \stackrel{\text{def}}{=} [0, 1]$ ,
- и в ситуации  $x = (x_1, \dots, x_n)$  игрок  $i$  выигрывает 
$$\phi_i(x) = x_i \left( 1 - \sum_{j=1}^n x_j \right).$$
- Нужно найти ситуацию равновесия
- и сравнить выигрыши игроков в ситуации равновесия с теми, которые игроки могут получить, если договорятся пропорционально разделить половину емкости канала.

# «Проклятие общего»

## Пример

- Предположим, что  $n$  ( $n > 4$ ) интернет провайдеров (в дальнейшем игроков) безконтрольно делят общий внешний канал выхода в интернет емкости 1.
- Игрок  $i \in N \stackrel{\text{def}}{=} \{1, \dots, n\}$  выбирает свою стратегию  $x_i \in S_i \stackrel{\text{def}}{=} [0, 1]$ ,
- и в ситуации  $x = (x_1, \dots, x_n)$  игрок  $i$  выигрывает 
$$\phi_i(x) = x_i \left(1 - \sum_{j=1}^n x_j\right).$$
- **Нужно найти ситуацию равновесия**
- и сравнить выигрыши игроков в ситуации равновесия с теми, которые игроки могут получить, если договорятся пропорционально разделить половину емкости канала.



# «Проклятие общего»

## Пример

- Предположим, что  $n$  ( $n > 4$ ) интернет провайдеров (в дальнейшем игроков) безконтрольно делят общий внешний канал выхода в интернет емкости 1.
- Игрок  $i \in N \stackrel{\text{def}}{=} \{1, \dots, n\}$  выбирает свою стратегию  $x_i \in S_i \stackrel{\text{def}}{=} [0, 1]$ ,
- и в ситуации  $x = (x_1, \dots, x_n)$  игрок  $i$  выигрывает 
$$\phi_i(x) = x_i \left(1 - \sum_{j=1}^n x_j\right).$$
- Нужно найти ситуацию равновесия
- и сравнить выигрыши игроков в ситуации равновесия с теми, которые игроки могут получить, если договорятся пропорционально разделить половину емкости канала.

# «Проклятие общего»: анализ игры

- Мы видим, что выигрыш  $\phi_i(x) = x_i \left(1 - \sum_{j=1}^n x_j\right)$  игрока  $i$  увеличивается с ростом его доли  $x_i$
- и убывает с ростом общей загрузки канала  $\sum_{j=1}^n x_j$ .
- Представив  $\phi_i(x)$  в следующем виде

$$\phi_i(x) = -x_i^2 + x_i \left(1 - \sum_{j \in N \setminus \{i\}} x_j\right),$$

- мы видим, что функция  $\phi_i(x)$  вогнута по  $x_i$  при фиксированных значениях  $x_j, j \in N \setminus \{i\}$ .
- Поэтому игра  $\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N})$  выпуклая, и по теореме Нэша она имеет ситуацию равновесия.

# «Проклятие общего»: анализ игры

- Мы видим, что выигрыш  $\phi_i(x) = x_i \left(1 - \sum_{j=1}^n x_j\right)$  игрока  $i$  увеличивается с ростом его доли  $x_i$
- и убывает с ростом общей загрузки канала  $\sum_{j=1}^n x_j$ .

- Представив  $\phi_i(x)$  в следующем виде

$$\phi_i(x) = -x_i^2 + x_i \left(1 - \sum_{j \in N \setminus \{i\}} x_j\right),$$

- мы видим, что функция  $\phi_i(x)$  вогнута по  $x_i$  при фиксированных значения  $x_j, j \in N \setminus \{i\}$ .
- Поэтому игра  $\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N})$  выпуклая, и по теореме Нэша она имеет ситуацию равновесия.

# «Проклятие общего»: анализ игры

- Мы видим, что выигрыш  $\phi_i(x) = x_i \left(1 - \sum_{j=1}^n x_j\right)$  игрока  $i$  увеличивается с ростом его доли  $x_i$
- и убывает с ростом общей загрузки канала  $\sum_{j=1}^n x_j$ .
- Представив  $\phi_i(x)$  в следующем виде

$$\phi_i(x) = -x_i^2 + x_i \left(1 - \sum_{j \in N \setminus \{i\}} x_j\right),$$

- мы видим, что функция  $\phi_i(x)$  вогнута по  $x_i$  при фиксированных значения  $x_j, j \in N \setminus \{i\}$ .
- Поэтому игра  $\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N})$  выпуклая, и по теореме Нэша она имеет ситуацию равновесия.

# «Проклятие общего»: анализ игры

- Мы видим, что выигрыш  $\phi_i(x) = x_i \left(1 - \sum_{j=1}^n x_j\right)$  игрока  $i$  увеличивается с ростом его доли  $x_i$
- и убывает с ростом общей загрузки канала  $\sum_{j=1}^n x_j$ .
- Представив  $\phi_i(x)$  в следующем виде

$$\phi_i(x) = -x_i^2 + x_i \left(1 - \sum_{j \in N \setminus \{i\}} x_j\right),$$

- мы видим, что функция  $\phi_i(x)$  вогнута по  $x_i$  при фиксированных значения  $x_j, j \in N \setminus \{i\}$ .
- Поэтому игра  $\gamma = (N, \{\mathcal{S}_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N})$  выпуклая, и по теореме Нэша она имеет ситуацию равновесия.

# «Проклятие общего»: анализ игры

- Мы видим, что выигрыш  $\phi_i(x) = x_i \left(1 - \sum_{j=1}^n x_j\right)$  игрока  $i$  увеличивается с ростом его доли  $x_i$
- и убывает с ростом общей загрузки канала  $\sum_{j=1}^n x_j$ .
- Представив  $\phi_i(x)$  в следующем виде

$$\phi_i(x) = -x_i^2 + x_i \left(1 - \sum_{j \in N \setminus \{i\}} x_j\right),$$

- мы видим, что функция  $\phi_i(x)$  вогнута по  $x_i$  при фиксированных значениях  $x_j, j \in N \setminus \{i\}$ .
- Поэтому игра  $\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N})$  выпуклая, и по теореме Нэша она имеет ситуацию равновесия.

## «Проклятие общего»: поиск равновесия

- При известных стратегиях  $x_j, j \in N \setminus \{i\}$ , игрок  $i \in N$  найдет свою стратегию  $x_i$ , решая задачу
 
$$\max \left\{ \phi_i(x) = -x_i^2 + x_i \left( 1 - \sum_{j \in N \setminus \{i\}} x_j \right) : x_i \in [0, 1] \right\}. \quad (*)$$
- При граничных значениях  $x_i = 0$  или  $x_i = 1$  выигрыш игрока  $i$  неположителен.
- Поэтому предположим, что все игроки не используют свои граничные стратегии.
- Тогда решение задачи (\*) должно удовлетворять условию оптимальности первого порядка:

$$\frac{\partial \phi_i}{\partial x_i}(x) = -2x_i + 1 - \sum_{j \in N \setminus \{i\}} x_j = 0.$$

- Решая систему линейных уравнений
 
$$2x_i + \sum_{j \in N \setminus \{i\}} x_j = 1, \quad i = 1, \dots, n,$$
- найдем единственную ситуацию равновесия
 
$$x^0 = (1/(n+1), \dots, 1/(n+1)).$$

## «Проклятие общего»: поиск равновесия

- При известных стратегиях  $x_j, j \in N \setminus \{i\}$ , игрок  $i \in N$  найдет свою стратегию  $x_i$ , решая задачу
 
$$\max \left\{ \phi_i(x) = -x_i^2 + x_i \left( 1 - \sum_{j \in N \setminus \{i\}} x_j \right) : x_i \in [0, 1] \right\}. \quad (*)$$
- При граничных значениях  $x_i = 0$  или  $x_i = 1$  выигрыш игрока  $i$  неположителен.
- Поэтому предположим, что все игроки не используют свои граничные стратегии.
- Тогда решение задачи (\*) должно удовлетворять условию оптимальности первого порядка:

$$\frac{\partial \phi_i}{\partial x_i}(x) = -2x_i + 1 - \sum_{j \in N \setminus \{i\}} x_j = 0.$$

- Решая систему линейных уравнений
 
$$2x_i + \sum_{j \in N \setminus \{i\}} x_j = 1, \quad i = 1, \dots, n,$$
- найдем единственную ситуацию равновесия
 
$$x^0 = (1/(n+1), \dots, 1/(n+1)).$$



## «Проклятие общего»: поиск равновесия

- При известных стратегиях  $x_j, j \in N \setminus \{i\}$ , игрок  $i \in N$  найдет свою стратегию  $x_i$ , решая задачу
 
$$\max \left\{ \phi_i(x) = -x_i^2 + x_i \left( 1 - \sum_{j \in N \setminus \{i\}} x_j \right) : x_i \in [0, 1] \right\}. \quad (*)$$
- При граничных значениях  $x_i = 0$  или  $x_i = 1$  выигрыш игрока  $i$  неположителен.
- Поэтому предположим, что все игроки не используют свои граничные стратегии.
- Тогда решение задачи (\*) должно удовлетворять условию оптимальности первого порядка:

$$\frac{\partial \phi_i}{\partial x_i}(x) = -2x_i + 1 - \sum_{j \in N \setminus \{i\}} x_j = 0.$$

- Решая систему линейных уравнений
 
$$2x_i + \sum_{j \in N \setminus \{i\}} x_j = 1, \quad i = 1, \dots, n,$$
- найдем единственную ситуацию равновесия

$$x^0 = (1/(n+1), \dots, 1/(n+1)).$$

## «Проклятие общего»: поиск равновесия

- При известных стратегиях  $x_j, j \in N \setminus \{i\}$ , игрок  $i \in N$  найдет свою стратегию  $x_i$ , решая задачу
 
$$\max \left\{ \phi_i(x) = -x_i^2 + x_i \left( 1 - \sum_{j \in N \setminus \{i\}} x_j \right) : x_i \in [0, 1] \right\}. \quad (*)$$
- При граничных значениях  $x_i = 0$  или  $x_i = 1$  выигрыш игрока  $i$  неположителен.
- Поэтому предположим, что все игроки не используют свои граничные стратегии.
- Тогда решение задачи (\*) должно удовлетворять условию оптимальности первого порядка:

$$\frac{\partial \phi_i}{\partial x_i}(x) = -2x_i + 1 - \sum_{j \in N \setminus \{i\}} x_j = 0.$$

- Решая систему линейных уравнений
 
$$2x_i + \sum_{j \in N \setminus \{i\}} x_j = 1, \quad i = 1, \dots, n,$$
- найдем единственную ситуацию равновесия

$$x^0 = (1/(n+1), \dots, 1/(n+1)).$$

## «Проклятие общего»: поиск равновесия

- При известных стратегиях  $x_j, j \in N \setminus \{i\}$ , игрок  $i \in N$  найдет свою стратегию  $x_i$ , решая задачу
 
$$\max \left\{ \phi_i(x) = -x_i^2 + x_i \left( 1 - \sum_{j \in N \setminus \{i\}} x_j \right) : x_i \in [0, 1] \right\}. \quad (*)$$
- При граничных значениях  $x_i = 0$  или  $x_i = 1$  выигрыш игрока  $i$  неположителен.
- Поэтому предположим, что все игроки не используют свои граничные стратегии.
- Тогда решение задачи (\*) должно удовлетворять условию оптимальности первого порядка:

$$\frac{\partial \phi_i}{\partial x_i}(x) = -2x_i + 1 - \sum_{j \in N \setminus \{i\}} x_j = 0.$$

- Решая систему линейных уравнений
 
$$2x_i + \sum_{j \in N \setminus \{i\}} x_j = 1, \quad i = 1, \dots, n,$$
- найдем единственную ситуацию равновесия

$$x^0 = (1/(n+1), \dots, 1/(n+1)).$$

## «Проклятие общего»: поиск равновесия

- При известных стратегиях  $x_j, j \in N \setminus \{i\}$ , игрок  $i \in N$  найдет свою стратегию  $x_i$ , решая задачу
 
$$\max \left\{ \phi_i(x) = -x_i^2 + x_i \left( 1 - \sum_{j \in N \setminus \{i\}} x_j \right) : x_i \in [0, 1] \right\}. \quad (*)$$
- При граничных значениях  $x_i = 0$  или  $x_i = 1$  выигрыш игрока  $i$  неположителен.
- Поэтому предположим, что все игроки не используют свои граничные стратегии.
- Тогда решение задачи (\*) должно удовлетворять условию оптимальности первого порядка:

$$\frac{\partial \phi_i}{\partial x_i}(x) = -2x_i + 1 - \sum_{j \in N \setminus \{i\}} x_j = 0.$$

- Решая систему линейных уравнений
 
$$2x_i + \sum_{j \in N \setminus \{i\}} x_j = 1, \quad i = 1, \dots, n,$$
- найдем единственную ситуацию равновесия
 
$$x^0 = (1/(n+1), \dots, 1/(n+1)).$$

# «Проклятие общего»: анализ ситуации равновесия

- В ситуацию равновесия  $x^0 = (1/(n+1), \dots, 1/(n+1))$  выигрыш каждого игрока равен

$$\phi_i(x^0) = \frac{1}{n+1} \cdot \left(1 - \frac{n}{n+1}\right) = \frac{1}{(n+1)^2}.$$

- При этом, общая загрузка канала равна  $\sum_{i=1}^n x_i^0 = n/(n+1)$  и при больших  $n$  близка к стопроцентной;
- С точки зрения клиентов «интернет работает медленно», поэтому выигрыши игроков мизерные.
- Если бы игроки смогли договориться пропорционально разделить половину емкости канала,
- то в ситуации  $x^1 = (1/2n, \dots, 1/2n)$  выигрыш каждого игрока  $i \in N$  составил бы  $\phi_i(x^1) = 1/4n$ ,
- что более чем в  $n/4$  раза превышает выигрыш в ситуации равновесия.

# «Проклятие общего»: анализ ситуации равновесия

- В ситуацию равновесия  $x^0 = (1/(n+1), \dots, 1/(n+1))$  выигрыш каждого игрока равен

$$\phi_i(x^0) = \frac{1}{n+1} \cdot \left(1 - \frac{n}{n+1}\right) = \frac{1}{(n+1)^2}.$$

- При этом, общая загрузка канала равна  $\sum_{i=1}^n x_i^0 = n/(n+1)$  и при больших  $n$  близка к стопроцентной;
- С точки зрения клиентов «интернет работает медленно», поэтому выигрыши игроков мизерные.
- Если бы игроки смогли договориться пропорционально разделить половину емкости канала,
- то в ситуации  $x^1 = (1/2n, \dots, 1/2n)$  выигрыш каждого игрока  $i \in N$  составил бы  $\phi_i(x^1) = 1/4n$ ,
- что более чем в  $n/4$  раза превышает выигрыш в ситуации равновесия.

# «Проклятие общего»: анализ ситуации равновесия

- В ситуацию равновесия  $x^0 = (1/(n+1), \dots, 1/(n+1))$  выигрыш каждого игрока равен

$$\phi_i(x^0) = \frac{1}{n+1} \cdot \left(1 - \frac{n}{n+1}\right) = \frac{1}{(n+1)^2}.$$

- При этом, общая загрузка канала равна  $\sum_{i=1}^n x_i^0 = n/(n+1)$  и при больших  $n$  близка к стопроцентной;
- С точки зрения клиентов «интернет работает медленно», поэтому выигрыши игроков мизерные.
- Если бы игроки смогли договориться пропорционально разделить половину емкости канала,
- то в ситуации  $x^1 = (1/2n, \dots, 1/2n)$  выигрыш каждого игрока  $i \in N$  составил бы  $\phi_i(x^1) = 1/4n$ ,
- что более чем в  $n/4$  раза превышает выигрыш в ситуации равновесия.

# «Проклятие общего»: анализ ситуации равновесия

- В ситуацию равновесия  $x^0 = (1/(n+1), \dots, 1/(n+1))$  выигрыш каждого игрока равен

$$\phi_i(x^0) = \frac{1}{n+1} \cdot \left(1 - \frac{n}{n+1}\right) = \frac{1}{(n+1)^2}.$$

- При этом, общая загрузка канала равна  $\sum_{i=1}^n x_i^0 = n/(n+1)$  и при больших  $n$  близка к стопроцентной;
- С точки зрения клиентов «интернет работает медленно», поэтому выигрыши игроков мизерные.
- Если бы игроки смогли договориться пропорционально разделить половину емкости канала,
- то в ситуации  $x^1 = (1/2n, \dots, 1/2n)$  выигрыш каждого игрока  $i \in N$  составил бы  $\phi_i(x^1) = 1/4n$ ,
- что более чем в  $n/4$  раза превышает выигрыш в ситуации равновесия.



# «Проклятие общего»: анализ ситуации равновесия

- В ситуацию равновесия  $x^0 = (1/(n+1), \dots, 1/(n+1))$  выигрыш каждого игрока равен

$$\phi_i(x^0) = \frac{1}{n+1} \cdot \left(1 - \frac{n}{n+1}\right) = \frac{1}{(n+1)^2}.$$

- При этом, общая загрузка канала равна  $\sum_{i=1}^n x_i^0 = n/(n+1)$  и при больших  $n$  близка к стопроцентной;
- С точки зрения клиентов «интернет работает медленно», поэтому выигрыши игроков мизерные.
- Если бы игроки смогли договориться пропорционально разделить половину емкости канала,
- то в ситуации  $x^1 = (1/2n, \dots, 1/2n)$  выигрыш каждого игрока  $i \in N$  составил бы  $\phi_i(x^1) = 1/4n$ ,
- что более чем в  $n/4$  раза превышает выигрыш в ситуации равновесия.

# «Проклятие общего»: анализ ситуации равновесия

- В ситуацию равновесия  $x^0 = (1/(n+1), \dots, 1/(n+1))$  выигрыш каждого игрока равен

$$\phi_i(x^0) = \frac{1}{n+1} \cdot \left(1 - \frac{n}{n+1}\right) = \frac{1}{(n+1)^2}.$$

- При этом, общая загрузка канала равна  $\sum_{i=1}^n x_i^0 = n/(n+1)$  и при больших  $n$  близка к стопроцентной;
- С точки зрения клиентов «интернет работает медленно», поэтому выигрыши игроков мизерные.
- Если бы игроки смогли договориться пропорционально разделить половину емкости канала,
- то в ситуации  $x^1 = (1/2n, \dots, 1/2n)$  выигрыш каждого игрока  $i \in N$  составил бы  $\phi_i(x^1) = 1/4n$ ,
- что более чем в  $n/4$  раза превышает выигрыш в ситуации равновесия.

# Содержание

- 1 Бескоалиционные игры, равновесие Нэша
  - Стратегическая форма бескоалиционной игры
  - Примеры бескоалиционных игр
  - Доминирование
- 2 Выпуклые игры
  - Теорема Нэша
  - Итерационный алгоритм решения выпуклых игр
- 3 Конечные бескоалиционные игры
  - Смешанные стратегии
  - Равновесие в смешанных стратегиях

# Итерационный алгоритм решения выпуклых игр

- Теорема Нэша гарантирует существование решения для выпуклых игр, но не указывает способа их решения.
- Рассмотрим теперь итерационный алгоритм решения выпуклой игры  $\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N})$ , где  $N = \{1, \dots, n\}$ .
- Итерации процесса естественно интерпретировать как последовательность партий, разыгрываемых игроками.

# Итерационный алгоритм решения выпуклых игр

- Теорема Нэша гарантирует существование решения для выпуклых игр, **но не указывает способа их решения.**
- Рассмотрим теперь итерационный алгоритм решения выпуклой игры  $\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N})$ , где  $N = \{1, \dots, n\}$ .
- Итерации процесса естественно интерпретировать как последовательность партий, разыгрываемых игроками.

# Итерационный алгоритм решения выпуклых игр

- Теорема Нэша гарантирует существование решения для выпуклых игр, но не указывает способа их решения.
- Рассмотрим теперь итерационный алгоритм решения выпуклой игры  $\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N})$ , где  $N = \{1, \dots, n\}$ .
- Итерации процесса естественно интерпретировать как последовательность партий, разыгрываемых игроками.

# Итерационный алгоритм решения выпуклых игр

- Теорема Нэша гарантирует существование решения для выпуклых игр, но не указывает способа их решения.
- Рассмотрим теперь итерационный алгоритм решения выпуклой игры  $\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N})$ , где  $N = \{1, \dots, n\}$ .
- Итерации процесса естественно интерпретировать как последовательность партий, разыгрываемых игроками.

# Итерационный алгоритм решения выпуклых игр

- Игроки начинают с некот. начальной ситуации  $s^0 \in S$ .
- На шаге  $k = 1, 2, \dots$  разыгрывается партия  $s^k \in S$
- как результат одновременного предъявления всеми игроками своих стратегий  $s_i^k$ , т. е.  $s^k = (s_1^k, \dots, s_n^k)$ .
- Игроки анализируют сложившуюся после партии  $k - 1$  ситуацию  $s^{k-1}$  и находят свои оптимальные ответы (стратегии)  $\bar{s}_i^{k-1}$ , которые им нужно было применять, если бы они предвидели заранее ситуацию  $s^{k-1}$ , т. е.

$$\bar{s}_i^{k-1} \in \arg \max_{s_i \in S_i} \phi_i(s_i, s_{-i}^{k-1}), \quad i = 1, \dots, n.$$

- Игроки корректируют использованные в предыдущей партии стратегии, вычисляя свои новые стратегии  $s_i^k$  для применения в  $k$ -й партии:

$$s_i^k = (1 - \lambda_k) s_i^{k-1} + \lambda_k \bar{s}_i^{k-1}, \quad i = 1, \dots, n.$$



# Итерационный алгоритм решения выпуклых игр

- Игроки начинают с некот. начальной ситуации  $s^0 \in S$ .
- На шаге  $k = 1, 2, \dots$  разыгрывается партия  $s^k \in S$
- как результат одновременного предъявления всеми игроками своих стратегий  $s_i^k$ , т. е.  $s^k = (s_1^k, \dots, s_n^k)$ .
- Игроки анализируют сложившуюся после партии  $k - 1$  ситуацию  $s^{k-1}$  и находят свои оптимальные ответы (стратегии)  $\bar{s}_i^{k-1}$ , которые им нужно было применять, если бы они предвидели заранее ситуацию  $s^{k-1}$ , т. е.

$$\bar{s}_i^{k-1} \in \arg \max_{s_i \in S_i} \phi_i(s_i, s_{-i}^{k-1}), \quad i = 1, \dots, n.$$

- Игроки корректируют использованные в предыдущей партии стратегии, вычисляя свои новые стратегии  $s_i^k$  для применения в  $k$ -й партии:

$$s_i^k = (1 - \lambda_k) s_i^{k-1} + \lambda_k \bar{s}_i^{k-1}, \quad i = 1, \dots, n.$$

# Итерационный алгоритм решения выпуклых игр

- Игроки начинают с некот. начальной ситуации  $s^0 \in S$ .
- На шаге  $k = 1, 2, \dots$  разыгрывается партия  $s^k \in S$
- как результат одновременного предъявления всеми игроками своих стратегий  $s_i^k$ , т. е.  $s^k = (s_1^k, \dots, s_n^k)$ .
- Игроки анализируют сложившуюся после партии  $k - 1$  ситуацию  $s^{k-1}$  и находят свои оптимальные ответы (стратегии)  $\bar{s}_i^{k-1}$ , которые им нужно было применять, если бы они предвидели заранее ситуацию  $s^{k-1}$ , т. е.

$$\bar{s}_i^{k-1} \in \arg \max_{s_i \in S_i} \phi_i(s_i, s_{-i}^{k-1}), \quad i = 1, \dots, n.$$

- Игроки корректируют использованные в предыдущей партии стратегии, вычисляя свои новые стратегии  $s_i^k$  для применения в  $k$ -й партии:

$$s_i^k = (1 - \lambda_k) s_i^{k-1} + \lambda_k \bar{s}_i^{k-1}, \quad i = 1, \dots, n.$$

# Итерационный алгоритм решения выпуклых игр

- Игроки начинают с некот. начальной ситуации  $s^0 \in S$ .
- На шаге  $k = 1, 2, \dots$  разыгрывается партия  $s^k \in S$
- как результат одновременного предъявления всеми игроками своих стратегий  $s_i^k$ , т. е.  $s^k = (s_1^k, \dots, s_n^k)$ .
- Игроки анализируют сложившуюся после партии  $k - 1$  ситуацию  $s^{k-1}$  и находят свои оптимальные ответы (стратегии)  $\bar{s}_i^{k-1}$ , которые им нужно было применять, если бы они предвидели заранее ситуацию  $s^{k-1}$ , т. е.

$$\bar{s}_i^{k-1} \in \arg \max_{s_i \in S_i} \phi_i(s_i, s_{-i}^{k-1}), \quad i = 1, \dots, n.$$

- Игроки корректируют использованные в предыдущей партии стратегии, вычисляя свои новые стратегии  $s_i^k$  для применения в  $k$ -й партии:

$$s_i^k = (1 - \lambda_k) s_i^{k-1} + \lambda_k \bar{s}_i^{k-1}, \quad i = 1, \dots, n.$$

# Итерационный алгоритм решения выпуклых игр

- Игроки начинают с некот. начальной ситуации  $s^0 \in S$ .
- На шаге  $k = 1, 2, \dots$  разыгрывается партия  $s^k \in S$
- как результат одновременного предъявления всеми игроками своих стратегий  $s_i^k$ , т. е.  $s^k = (s_1^k, \dots, s_n^k)$ .
- Игроки анализируют сложившуюся после партии  $k - 1$  ситуацию  $s^{k-1}$  и находят свои оптимальные ответы (стратегии)  $\bar{s}_i^{k-1}$ , которые им нужно было применять, если бы они предвидели заранее ситуацию  $s^{k-1}$ , т. е.

$$\bar{s}_i^{k-1} \in \arg \max_{s_i \in S_i} \phi_i(s_i, s_{-i}^{k-1}), \quad i = 1, \dots, n.$$

- Игроки корректируют использованные в предыдущей партии стратегии, вычисляя свои новые стратегии  $s_i^k$  для применения в  $k$ -й партии:

$$s_i^k = (1 - \lambda_k) s_i^{k-1} + \lambda_k \bar{s}_i^{k-1}, \quad i = 1, \dots, n.$$

# Итерационный алгоритм решения выпуклых игр

- Игроки начинают с некот. начальной ситуации  $s^0 \in S$ .
- На шаге  $k = 1, 2, \dots$  разыгрывается партия  $s^k \in S$
- как результат одновременного предъявления всеми игроками своих стратегий  $s_i^k$ , т. е.  $s^k = (s_1^k, \dots, s_n^k)$ .
- Игроки анализируют сложившуюся после партии  $k - 1$  ситуацию  $s^{k-1}$  и находят свои оптимальные ответы (стратегии)  $\bar{s}_i^{k-1}$ , **которые им нужно было применять, если бы они предвидели заранее ситуацию  $s^{k-1}$** , т. е.

$$\bar{s}_i^{k-1} \in \arg \max_{s_i \in S_i} \phi_i(s_i, s_{-i}^{k-1}), \quad i = 1, \dots, n.$$

- Игроки корректируют использованные в предыдущей партии стратегии, вычисляя свои новые стратегии  $s_i^k$  для применения в  $k$ -й партии:

$$s_i^k = (1 - \lambda_k) s_i^{k-1} + \lambda_k \bar{s}_i^{k-1}, \quad i = 1, \dots, n.$$

# Итерационный алгоритм решения выпуклых игр

- Игроки начинают с некот. начальной ситуации  $s^0 \in S$ .
- На шаге  $k = 1, 2, \dots$  разыгрывается партия  $s^k \in S$
- как результат одновременного предъявления всеми игроками своих стратегий  $s_i^k$ , т. е.  $s^k = (s_1^k, \dots, s_n^k)$ .
- Игроки анализируют сложившуюся после партии  $k - 1$  ситуацию  $s^{k-1}$  и находят свои оптимальные ответы (стратегии)  $\bar{s}_i^{k-1}$ , которые им нужно было применять, если бы они предвидели заранее ситуацию  $s^{k-1}$ , т. е.

$$\bar{s}_i^{k-1} \in \arg \max_{s_i \in S_i} \phi_i(s_i, s_{-i}^{k-1}), \quad i = 1, \dots, n.$$

- Игроки корректируют использованные в предыдущей партии стратегии, вычисляя свои новые стратегии  $\bar{s}_i^k$  для применения в  $k$ -й партии:

$$\bar{s}_i^k = (1 - \lambda_k) s_i^{k-1} + \lambda_k \bar{s}_i^{k-1}, \quad i = 1, \dots, n.$$

# Итерационный алгоритм решения выпуклых игр

- Игроки начинают с некот. начальной ситуации  $s^0 \in S$ .
- На шаге  $k = 1, 2, \dots$  разыгрывается партия  $s^k \in S$
- как результат одновременного предъявления всеми игроками своих стратегий  $s_i^k$ , т. е.  $s^k = (s_1^k, \dots, s_n^k)$ .
- Игроки анализируют сложившуюся после партии  $k - 1$  ситуацию  $s^{k-1}$  и находят свои оптимальные ответы (стратегии)  $\bar{s}_i^{k-1}$ , которые им нужно было применять, если бы они предвидели заранее ситуацию  $s^{k-1}$ , т. е.

$$\bar{s}_i^{k-1} \in \arg \max_{s_i \in S_i} \phi_i(s_i, s_{-i}^{k-1}), \quad i = 1, \dots, n.$$

- Игроки корректируют использованные в предыдущей партии стратегии, вычисляя свои новые стратегии  $s_i^k$  для применения в  $k$ -й партии:

$$s_i^k = (1 - \lambda_k) s_i^{k-1} + \lambda_k \bar{s}_i^{k-1}, \quad i = 1, \dots, n.$$

# Итерационный алгоритм решения выпуклых игр

- Игроки начинают с некот. начальной ситуации  $s^0 \in S$ .
- На шаге  $k = 1, 2, \dots$  разыгрывается партия  $s^k \in S$
- как результат одновременного предъявления всеми игроками своих стратегий  $s_i^k$ , т. е.  $s^k = (s_1^k, \dots, s_n^k)$ .
- Игроки анализируют сложившуюся после партии  $k - 1$  ситуацию  $s^{k-1}$  и находят свои оптимальные ответы (стратегии)  $\bar{s}_i^{k-1}$ , которые им нужно было применять, если бы они предвидели заранее ситуацию  $s^{k-1}$ , т. е.

$$\bar{s}_i^{k-1} \in \arg \max_{s_i \in S_i} \phi_i(s_i, s_{-i}^{k-1}), \quad i = 1, \dots, n.$$

- Игроки корректируют использованные в предыдущей партии стратегии, **вычисляя свои новые стратегии  $s_i^k$  для применения в  $k$ -й партии:**

$$s_i^k = (1 - \lambda_k) s_i^{k-1} + \lambda_k \bar{s}_i^{k-1}, \quad i = 1, \dots, n.$$



# Сходимость итерационного процесса

- Параметр  $\lambda_k$  в формуле  $s_i^k = (1 - \lambda_k)s_i^{k-1} + \lambda_k \bar{s}_i^{k-1}$  интерпрет. как степень доверия новой информации после опыта, накопленного в ранее сыгранных партиях.
- Сходится ли послед.  $s^0, s^1, \dots, s^k, \dots$  и, если сходится, то является ли  $s^* = \lim_{k \rightarrow \infty} s^k$  ситуацией равновесия?
- Если придерживаться слишком консервативной политики, когда  $\sum_{k=0}^{\infty} \lambda_k < \infty$ , то процес сойдется, но он может и не дойти до ситуации равновесия  $s^*$ .
- Если проявлять чрезмерную склонность к переменам, когда  $\lambda_k$  не стремится к нулю, то это может привести к тому, что устойчивое состояние так и не будет найдено.
- Наиболее простой и естественной политикой при выборе шагов  $\lambda_k$  является политика равного доверия ко всем возникающим в процессе игры оптимальных ответам:

$$\frac{\lambda_k}{1 - \lambda_k} = \frac{1}{k} \quad \Rightarrow \quad \lambda_k = \frac{1}{k + 1}.$$

# Сходимость итерационного процесса

- Параметр  $\lambda_k$  в формуле  $s_i^k = (1 - \lambda_k)s_i^{k-1} + \lambda_k \bar{s}_i^{k-1}$  интерпрет. как степень доверия новой информации после опыта, накопленного в ранее сыгранных партиях.
- Сходится ли послед.  $s^0, s^1, \dots, s^k, \dots$  и, если сходится, то является ли  $s^* = \lim_{k \rightarrow \infty} s^k$  ситуацией равновесия?
- Если придерживаться слишком консервативной политики, когда  $\sum_{k=0}^{\infty} \lambda_k < \infty$ , то процес сойдется, но он может и не дойти до ситуации равновесия  $s^*$ .
- Если проявлять чрезмерную склонность к переменам, когда  $\lambda_k$  не стремится к нулю, то это может привести к тому, что устойчивое состояние так и не будет найдено.
- Наиболее простой и естественной политикой при выборе шагов  $\lambda_k$  является политика равного доверия ко всем возникающим в процессе игры оптимальным ответам:

$$\frac{\lambda_k}{1 - \lambda_k} = \frac{1}{k} \quad \Rightarrow \quad \lambda_k = \frac{1}{k + 1}.$$

# Сходимость итерационного процесса

- Параметр  $\lambda_k$  в формуле  $s_i^k = (1 - \lambda_k)s_i^{k-1} + \lambda_k \bar{s}_i^{k-1}$  интерпрет. как степень доверия новой информации после опыта, накопленного в ранее сыгранных партиях.
- Сходится ли послед.  $s^0, s^1, \dots, s^k, \dots$  и, если сходится, то является ли  $s^* = \lim_{k \rightarrow \infty} s^k$  ситуацией равновесия?
- Если придерживаться слишком консервативной политики, когда  $\sum_{k=0}^{\infty} \lambda_k < \infty$ , то процес сойдется, но он может и не дойти до ситуации равновесия  $s^*$ .
- Если проявлять чрезмерную склонность к переменам, когда  $\lambda_k$  не стремится к нулю, то это может привести к тому, что устойчивое состояние так и не будет найдено.
- Наиболее простой и естественной политикой при выборе шагов  $\lambda_k$  является политика равного доверия ко всем возникающим в процессе игры оптимальным ответам:

$$\frac{\lambda_k}{1 - \lambda_k} = \frac{1}{k} \quad \Rightarrow \quad \lambda_k = \frac{1}{k + 1}.$$

# Сходимость итерационного процесса

- Параметр  $\lambda_k$  в формуле  $s_i^k = (1 - \lambda_k)s_i^{k-1} + \lambda_k \bar{s}_i^{k-1}$  интерпрет. как степень доверия новой информации после опыта, накопленного в ранее сыгранных партиях.
- Сходится ли послед.  $s^0, s^1, \dots, s^k, \dots$  и, если сходится, то является ли  $s^* = \lim_{k \rightarrow \infty} s^k$  ситуацией равновесия?
- Если придерживаться слишком консервативной политики, когда  $\sum_{k=0}^{\infty} \lambda_k < \infty$ , то процес сойдется, но он может и не дойти до ситуации равновесия  $s^*$ .
- Если проявлять чрезмерную склонность к переменам, когда  $\lambda_k$  не стремится к нулю, то это может привести к тому, что устойчивое состояние так и не будет найдено.
- Наиболее простой и естественной политикой при выборе шагов  $\lambda_k$  является политика равного доверия ко всем возникающим в процессе игры оптимальных ответам:

$$\frac{\lambda_k}{1 - \lambda_k} = \frac{1}{k} \quad \Rightarrow \quad \lambda_k = \frac{1}{k + 1}.$$

# Сходимость итерационного процесса

- Параметр  $\lambda_k$  в формуле  $s_i^k = (1 - \lambda_k)s_i^{k-1} + \lambda_k \bar{s}_i^{k-1}$  интерпрет. как степень доверия новой информации после опыта, накопленного в ранее сыгранных партиях.
- Сходится ли послед.  $s^0, s^1, \dots, s^k, \dots$  и, если сходится, то является ли  $s^* = \lim_{k \rightarrow \infty} s^k$  ситуацией равновесия?
- Если придерживаться слишком консервативной политики, когда  $\sum_{k=0}^{\infty} \lambda_k < \infty$ , то процес сойдется, но он может и не дойти до ситуации равновесия  $s^*$ .
- Если проявлять чрезмерную склонность к переменам, когда  $\lambda_k$  не стремится к нулю, то это может привести к тому, что устойчивое состояние так и не будет найдено.
- Наиболее простой и естественной политикой при выборе шагов  $\lambda_k$  является политика равного доверия ко всем возникающим в процессе игры оптимальных ответам:

$$\frac{\lambda_k}{1 - \lambda_k} = \frac{1}{k} \quad \Rightarrow \quad \lambda_k = \frac{1}{k + 1}.$$

# Сходимость итерационного процесса

- Параметр  $\lambda_k$  в формуле  $s_i^k = (1 - \lambda_k)s_i^{k-1} + \lambda_k \bar{s}_i^{k-1}$  интерпрет. как степень доверия новой информации после опыта, накопленного в ранее сыгранных партиях.
- Сходится ли послед.  $s^0, s^1, \dots, s^k, \dots$  и, если сходится, то является ли  $s^* = \lim_{k \rightarrow \infty} s^k$  ситуацией равновесия?
- Если придерживаться слишком консервативной политики, когда  $\sum_{k=0}^{\infty} \lambda_k < \infty$ , **то процес сойдется, но он может и не дойти до ситуации равновесия  $s^*$ .**
- Если проявлять чрезмерную склонность к переменам, когда  $\lambda_k$  не стремится к нулю, то это может привести к тому, что устойчивое состояние так и не будет найдено.
- Наиболее простой и естественной политикой при выборе шагов  $\lambda_k$  является политика равного доверия ко всем возникающим в процессе игры оптимальным ответам:

$$\frac{\lambda_k}{1 - \lambda_k} = \frac{1}{k} \quad \Rightarrow \quad \lambda_k = \frac{1}{k + 1}.$$

# Сходимость итерационного процесса

- Параметр  $\lambda_k$  в формуле  $s_i^k = (1 - \lambda_k)s_i^{k-1} + \lambda_k \bar{s}_i^{k-1}$  интерпрет. как степень доверия новой информации после опыта, накопленного в ранее сыгранных партиях.
- Сходится ли послед.  $s^0, s^1, \dots, s^k, \dots$  и, если сходится, то является ли  $s^* = \lim_{k \rightarrow \infty} s^k$  ситуацией равновесия?
- Если придерживаться слишком консервативной политики, когда  $\sum_{k=0}^{\infty} \lambda_k < \infty$ , то процес сойдется, но он может и не дойти до ситуации равновесия  $s^*$ .
- Если проявлять чрезмерную склонность к переменам, когда  $\lambda_k$  не стремится к нулю, то это может привести к тому, что устойчивое состояние так и не будет найдено.
- Наиболее простой и естественной политикой при выборе шагов  $\lambda_k$  является политика равного доверия ко всем возникающим в процессе игры оптимальным ответам:

$$\frac{\lambda_k}{1 - \lambda_k} = \frac{1}{k} \quad \Rightarrow \quad \lambda_k = \frac{1}{k + 1}.$$

# Сходимость итерационного процесса

- Параметр  $\lambda_k$  в формуле  $s_i^k = (1 - \lambda_k)s_i^{k-1} + \lambda_k \bar{s}_i^{k-1}$  интерпрет. как степень доверия новой информации после опыта, накопленного в ранее сыгранных партиях.
- Сходится ли послед.  $s^0, s^1, \dots, s^k, \dots$  и, если сходится, то является ли  $s^* = \lim_{k \rightarrow \infty} s^k$  ситуацией равновесия?
- Если придерживаться слишком консервативной политики, когда  $\sum_{k=0}^{\infty} \lambda_k < \infty$ , то процес сойдется, но он может и не дойти до ситуации равновесия  $s^*$ .
- Если проявлять чрезмерную склонность к переменам, когда  $\lambda_k$  не стремится к нулю, **то это может привести к тому, что устойчивое состояние так и не будет найдено.**
- Наиболее простой и естественной политикой при выборе шагов  $\lambda_k$  является политика равного доверия ко всем возникающим в процессе игры оптимальных ответам:

$$\frac{\lambda_k}{1 - \lambda_k} = \frac{1}{k} \quad \Rightarrow \quad \lambda_k = \frac{1}{k + 1}.$$



# Сходимость итерационного процесса

- Параметр  $\lambda_k$  в формуле  $s_i^k = (1 - \lambda_k)s_i^{k-1} + \lambda_k \bar{s}_i^{k-1}$  интерпрет. как степень доверия новой информации после опыта, накопленного в ранее сыгранных партиях.
- Сходится ли послед.  $s^0, s^1, \dots, s^k, \dots$  и, если сходится, то является ли  $s^* = \lim_{k \rightarrow \infty} s^k$  ситуацией равновесия?
- Если придерживаться слишком консервативной политики, когда  $\sum_{k=0}^{\infty} \lambda_k < \infty$ , то процес сойдется, но он может и не дойти до ситуации равновесия  $s^*$ .
- Если проявлять чрезмерную склонность к переменам, когда  $\lambda_k$  не стремится к нулю, то это может привести к тому, что устойчивое состояние так и не будет найдено.
- Наиболее простой и естественной политикой при выборе шагов  $\lambda_k$  является политика равного доверия ко всем возникающим в процессе игры оптимальных ответам:

$$\frac{\lambda_k}{1 - \lambda_k} = \frac{1}{k} \quad \Rightarrow \quad \lambda_k = \frac{1}{k + 1}.$$

# Содержание

- 1 Бескоалиционные игры, равновесие Нэша
  - Стратегическая форма бескоалиционной игры
  - Примеры бескоалиционных игр
  - Доминирование
- 2 Выпуклые игры
  - Теорема Нэша
  - Итерационный алгоритм решения выпуклых игр
- 3 Конечные бескоалиционные игры
  - Смешанные стратегии
  - Равновесие в смешанных стратегиях

# Что делать, когда в игре нет равновесий?

- Пусть в бескоалиционной игре  $n$  лиц

$$\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N})$$

- каждый игрок  $i$  имеет конечное число стратегий  $n_i$ .
- Для простоты представления будем считать, что  $S_i = \{1, \dots, n_i\}$ ,  $i \in N = \{1, \dots, n\}$ .
- Решениями бескоалиционной игры являются ситуации равновесия.
- Многие бескоалиционные игры не имеют ситуаций равновесия.
- Чтобы это исправить, нам нужно некоторым образом расширить понятие стратегии с целью получить игру, которая имела бы решение.
- Существует несколько способов сделать это.

# Что делать, когда в игре нет равновесий?

- Пусть в бескоалиционной игре  $n$  лиц

$$\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N})$$

- **каждый игрок  $i$  имеет конечное число стратегий  $n_i$ .**
- Для простоты представления будем считать, что  $S_i = \{1, \dots, n_i\}$ ,  $i \in N = \{1, \dots, n\}$ .
- Решениями бескоалиционной игры являются ситуации равновесия.
- Многие бескоалиционные игры не имеют ситуаций равновесия.
- Чтобы это исправить, нам нужно некоторым образом расширить понятие стратегии с целью получить игру, которая имела бы решение.
- Существует несколько способов сделать это.

# Что делать, когда в игре нет равновесий?

- Пусть в бескоалиционной игре  $n$  лиц

$$\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N})$$

- каждый игрок  $i$  имеет конечное число стратегий  $n_i$ .
- Для простоты представления будем считать, что  $S_i = \{1, \dots, n_i\}$ ,  $i \in N = \{1, \dots, n\}$ .
- Решениями бескоалиционной игры являются ситуации равновесия.
- Многие бескоалиционные игры не имеют ситуаций равновесия.
- Чтобы это исправить, нам нужно некоторым образом расширить понятие стратегии с целью получить игру, которая имела бы решение.
- Существует несколько способов сделать это.

# Что делать, когда в игре нет равновесий?

- Пусть в бескоалиционной игре  $n$  лиц

$$\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N})$$

- каждый игрок  $i$  имеет конечное число стратегий  $n_i$ .
- Для простоты представления будем считать, что  $S_i = \{1, \dots, n_i\}$ ,  $i \in N = \{1, \dots, n\}$ .
- Решениями бескоалиционной игры являются ситуации равновесия.
- Многие бескоалиционные игры не имеют ситуаций равновесия.
- Чтобы это исправить, нам нужно некоторым образом расширить понятие стратегии с целью получить игру, которая имела бы решение.
- Существует несколько способов сделать это.

# Что делать, когда в игре нет равновесий?

- Пусть в бескоалиционной игре  $n$  лиц

$$\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N})$$

- каждый игрок  $i$  имеет конечное число стратегий  $n_i$ .
- Для простоты представления будем считать, что  $S_i = \{1, \dots, n_i\}$ ,  $i \in N = \{1, \dots, n\}$ .
- Решениями бескоалиционной игры являются ситуации равновесия.
- Многие бескоалиционные игры не имеют ситуаций равновесия.
- Чтобы это исправить, нам нужно некоторым образом расширить понятие стратегии с целью получить игру, которая имела бы решение.
- Существует несколько способов сделать это.

# Что делать, когда в игре нет равновесий?

- Пусть в бескоалиционной игре  $n$  лиц

$$\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N})$$

- каждый игрок  $i$  имеет конечное число стратегий  $n_i$ .
- Для простоты представления будем считать, что  $S_i = \{1, \dots, n_i\}$ ,  $i \in N = \{1, \dots, n\}$ .
- Решениями бескоалиционной игры являются ситуации равновесия.
- Многие бескоалиционные игры не имеют ситуаций равновесия.
- Чтобы это исправить, нам нужно некоторым образом расширить понятие стратегии с целью получить игру, которая имела бы решение.
- Существует несколько способов сделать это.



# Что делать, когда в игре нет равновесий?

- Пусть в бескоалиционной игре  $n$  лиц

$$\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N})$$

- каждый игрок  $i$  имеет конечное число стратегий  $n_i$ .
- Для простоты представления будем считать, что  $S_i = \{1, \dots, n_i\}$ ,  $i \in N = \{1, \dots, n\}$ .
- Решениями бескоалиционной игры являются ситуации равновесия.
- Многие бескоалиционные игры не имеют ситуаций равновесия.
- Чтобы это исправить, нам нужно некоторым образом расширить понятие стратегии с целью получить игру, которая имела бы решение.
- Существует несколько способов сделать это.

# Смешанные стратегии: мотивация

- Наиболее известный способ расширить понятие стратегии базируется на следующих рассуждениях.
- Предполагается, что игра будет повторяться многократно.
- В силу допущения о разумности игроков, принятого в теории игр, нужно допустить, что
- если игрок использует свои стратегии с некоторой детерминированной закономерностью,
- то его оппоненты разгадают эту стратегию.
- Остается использовать свои стратегии случайным образом, но с определенной закономерностью,
- поскольку иначе игра превратится в случайный процесс.

# Смешанные стратегии: мотивация

- Наиболее известный способ расширить понятие стратегии базируется на следующих рассуждениях.
- Предполагается, что игра будет повторяться многократно.
- В силу допущения о разумности игроков, принятого в теории игр, нужно допустить, что
- если игрок использует свои стратегии с некоторой детерминированной закономерностью,
- то его оппоненты разгадают эту стратегию.
- Остается использовать свои стратегии случайным образом, но с определенной закономерностью,
- поскольку иначе игра превратится в случайный процесс.

# Смешанные стратегии: мотивация

- Наиболее известный способ расширить понятие стратегии базируется на следующих рассуждениях.
- Предполагается, что игра будет повторяться многократно.
- В силу допущения о разумности игроков, принятого в теории игр, нужно допустить, что
- если игрок использует свои стратегии с некоторой детерминированной закономерностью,
- то его оппоненты разгадают эту стратегию.
- Остается использовать свои стратегии случайным образом, но с определенной закономерностью,
- поскольку иначе игра превратится в случайный процесс.

# Смешанные стратегии: мотивация

- Наиболее известный способ расширить понятие стратегии базируется на следующих рассуждениях.
- Предполагается, что игра будет повторяться многократно.
- В силу допущения о разумности игроков, принятого в теории игр, нужно допустить, что
- если игрок использует свои стратегии с некоторой детерминированной закономерностью,
- то его оппоненты разгадают эту стратегию.
- Остается использовать свои стратегии случайным образом, но с определенной закономерностью,
- поскольку иначе игра превратится в случайный процесс.

# Смешанные стратегии: мотивация

- Наиболее известный способ расширить понятие стратегии базируется на следующих рассуждениях.
- Предполагается, что игра будет повторяться многократно.
- В силу допущения о разумности игроков, принятого в теории игр, нужно допустить, что
- если игрок использует свои стратегии с некоторой детерминированной закономерностью,
- то его оппоненты разгадают эту стратегию.
- Остается использовать свои стратегии случайным образом, но с определенной закономерностью,
- поскольку иначе игра превратится в случайный процесс.

# Смешанные стратегии: мотивация

- Наиболее известный способ расширить понятие стратегии базируется на следующих рассуждениях.
- Предполагается, что игра будет повторяться многократно.
- В силу допущения о разумности игроков, принятого в теории игр, нужно допустить, что
- если игрок использует свои стратегии с некоторой детерминированной закономерностью,
- то его оппоненты разгадают эту стратегию.
- **Остается использовать свои стратегии случайным образом, но с определенной закономерностью,**
- поскольку иначе игра превратится в случайный процесс.

# Смешанные стратегии: мотивация

- Наиболее известный способ расширить понятие стратегии базируется на следующих рассуждениях.
- Предполагается, что игра будет повторяться многократно.
- В силу допущения о разумности игроков, принятого в теории игр, нужно допустить, что
- если игрок использует свои стратегии с некоторой детерминированной закономерностью,
- то его оппоненты разгадают эту стратегию.
- Остается использовать свои стратегии случайным образом, но с определенной закономерностью,
- **поскольку иначе игра превратится в случайный процесс.**



# Смешанные стратегии

В дальнейшем стратегии игроков будем называть *чистыми стратегиями*, чтобы отличать их от смешанных стратегий, к рассмотрению которых мы приступаем.

## Определение

*Смешанной стратегией*  $p_i$  игрока  $i$  ( $i = 1, \dots, n$ ) в конечной бескоалиционной игре называется полный набор вероятностей применения его чистых стратегий, т. е.

$$p_i = (p_{i1}, p_{i2}, \dots, p_{i, n_i}), \quad \sum_{j=1}^{n_i} p_{ij} = 1, \quad p_{ij} \geq 0, \quad j = 1, \dots, n_i.$$

- Множество смешанных стратегий  $\mathcal{S}_i$  игрока  $i$  есть симплекс  $\Sigma_{n_i}$ .
- Смешанная стратегия  $e_j \in \mathcal{S}_i$  игрока  $i$  соответствует его  $j$ -й чистой стратегии.

# Смешанные стратегии

В дальнейшем стратегии игроков будем называть *чистыми стратегиями*, чтобы отличать их от смешанных стратегий, к рассмотрению которых мы приступаем.

## Определение

*Смешанной стратегией*  $p_i$  игрока  $i$  ( $i = 1, \dots, n$ ) в конечной бескоалиционной игре называется полный набор вероятностей применения его чистых стратегий, т. е.

$$p_i = (p_{i1}, p_{i2}, \dots, p_{i, n_i}), \quad \sum_{j=1}^{n_i} p_{ij} = 1, \quad p_{ij} \geq 0, \quad j = 1, \dots, n_i.$$

- Множество смешанных стратегий  $\mathcal{S}_i$  игрока  $i$  есть симплекс  $\Sigma_{n_i}$ .
- Смешанная стратегия  $e_j \in \mathcal{S}_i$  игрока  $i$  соответствует его  $j$ -й чистой стратегии.

# Смешанные стратегии

В дальнейшем стратегии игроков будем называть *чистыми стратегиями*, чтобы отличать их от смешанных стратегий, к рассмотрению которых мы приступаем.

## Определение

*Смешанной стратегией*  $p_i$  игрока  $i$  ( $i = 1, \dots, n$ ) в конечной бескоалиционной игре называется полный набор вероятностей применения его чистых стратегий, т. е.

$$p_i = (p_{i1}, p_{i2}, \dots, p_{i, n_i}), \quad \sum_{j=1}^{n_i} p_{ij} = 1, \quad p_{ij} \geq 0, \quad j = 1, \dots, n_i.$$

- Множество смешанных стратегий  $\mathcal{S}_i$  игрока  $i$  есть симплекс  $\Sigma_{n_i}$ .
- Смешанная стратегия  $e_j \in \mathcal{S}_i$  игрока  $i$  соответствует его  $j$ -й чистой стратегии.

# Смешанные стратегии

В дальнейшем стратегии игроков будем называть *чистыми стратегиями*, чтобы отличать их от смешанных стратегий, к рассмотрению которых мы приступаем.

## Определение

Смешанной стратегией  $p_i$  игрока  $i$  ( $i = 1, \dots, n$ ) в конечной бескоалиционной игре **называется полный набор вероятностей применения его чистых стратегий, т. е.**

$$p_i = (p_{i1}, p_{i2}, \dots, p_{i, n_i}), \quad \sum_{j=1}^{n_i} p_{ij} = 1, \quad p_{ij} \geq 0, \quad j = 1, \dots, n_i.$$

- Множество смешанных стратегий  $\mathcal{S}_i$  игрока  $i$  есть симплекс  $\Sigma_{n_i}$ .
- Смешанная стратегия  $e_j \in \mathcal{S}_i$  игрока  $i$  соответствует его  $j$ -й чистой стратегии.

# Смешанные стратегии

В дальнейшем стратегии игроков будем называть *чистыми стратегиями*, чтобы отличать их от смешанных стратегий, к рассмотрению которых мы приступаем.

## Определение

*Смешанной стратегией*  $p_i$  игрока  $i$  ( $i = 1, \dots, n$ ) в конечной бескоалиционной игре называется полный набор вероятностей применения его чистых стратегий, т. е.

$$p_i = (p_{i1}, p_{i2}, \dots, p_{i, n_i}), \quad \sum_{j=1}^{n_i} p_{ij} = 1, \quad p_{ij} \geq 0, \quad j = 1, \dots, n_i.$$

- Множество смешанных стратегий  $\mathcal{S}_i$  игрока  $i$  есть симплекс  $\Sigma_{n_i}$ .
- Смешанная стратегия  $e_j \in \mathcal{S}_i$  игрока  $i$  соответствует его  $j$ -й чистой стратегии.

# Смешанные стратегии

В дальнейшем стратегии игроков будем называть *чистыми стратегиями*, чтобы отличать их от смешанных стратегий, к рассмотрению которых мы приступаем.

## Определение

*Смешанной стратегией*  $p_i$  игрока  $i$  ( $i = 1, \dots, n$ ) в конечной бескоалиционной игре называется полный набор вероятностей применения его чистых стратегий, т. е.

$$p_i = (p_{i1}, p_{i2}, \dots, p_{i, n_i}), \quad \sum_{j=1}^{n_i} p_{ij} = 1, \quad p_{ij} \geq 0, \quad j = 1, \dots, n_i.$$

- Множество смешанных стратегий  $\mathcal{S}_i$  игрока  $i$  есть симплекс  $\Sigma_{n_i}$ .
- Смешанная стратегия  $e_j \in \mathcal{S}_i$  игрока  $i$  соответствует его  $j$ -й чистой стратегии.

# Смешанные стратегии

В дальнейшем стратегии игроков будем называть *чистыми стратегиями*, чтобы отличать их от смешанных стратегий, к рассмотрению которых мы приступаем.

## Определение


*Смешанной стратегией*  $p_i$  игрока  $i$  ( $i = 1, \dots, n$ ) в конечной бескоалиционной игре называется полный набор вероятностей применения его чистых стратегий, т. е.

$$p_i = (p_{i1}, p_{i2}, \dots, p_{i, n_i}), \quad \sum_{j=1}^{n_i} p_{ij} = 1, \quad p_{ij} \geq 0, \quad j = 1, \dots, n_i.$$

- Множество смешанных стратегий  $\mathcal{S}_i$  игрока  $i$  есть симплекс  $\Sigma_{n_i}$ .
- Смешанная стратегия  $e_j \in \mathcal{S}_i$  игрока  $i$  соответствует его  $j$ -й чистой стратегии.

# Один из способов реализации смешанных стратегий


- Свою смешанную стратегию  $p_i = (p_{i1}, \dots, p_{in_i})$  игрок  $i$  может реализовать,
- например, сделав рулетку, в которой  $n_i$  секторов,
- $j$ -й сектор размера  $p_{ij} \cdot 360^\circ$ .
- Перед началом очередной партии игрок крутит колесо рулетки и, после того, как оно остановится,
- номер сектора  $j$ , на который указывает стрелка рулетки, определяет стратегию, которую игрок применит в этой партии.






# Один из способов реализации смешанных стратегий

- Свою смешанную стратегию  $p_i = (p_{i1}, \dots, p_{in_i})$  игрок  $i$  может реализовать,
- например, сделав рулетку, в которой  $n_i$  секторов,
- $j$ -й сектор размера  $p_{ij} \cdot 360^\circ$ .
- Перед началом очередной партии игрок крутит колесо рулетки и, после того, как оно остановится,
- номер сектора  $j$ , на который указывает стрелка рулетки, определяет стратегию, которую игрок применит в этой партии.




# Один из способов реализации смешанных стратегий

- Свою смешанную стратегию  $p_i = (p_{i1}, \dots, p_{in_i})$  игрок  $i$  может реализовать,
- например, сделав рулетку, в которой  $n_i$  секторов,
- $j$ -й сектор размера  $p_{ij} \cdot 360^\circ$ .
- Перед началом очередной партии игрок крутит колесо рулетки и, после того, как оно остановится,
- номер сектора  $j$ , на который указывает стрелка рулетки, определяет стратегию, которую игрок применит в этой партии.




# Один из способов реализации смешанных стратегий

- Свою смешанную стратегию  $p_i = (p_{i1}, \dots, p_{in_i})$  игрок  $i$  может реализовать,
- например, сделав рулетку, в которой  $n_i$  секторов,
- $j$ -й сектор размера  $p_{ij} \cdot 360^\circ$ .
- **Перед началом очередной партии игрок крутит колесо рулетки и, после того, как оно остановится,**
- номер сектора  $j$ , на который указывает стрелка рулетки, определяет стратегию, которую игрок применит в этой партии.



# Один из способов реализации смешанных стратегий

- Свою смешанную стратегию  $p_i = (p_{i1}, \dots, p_{in_i})$  игрок  $i$  может реализовать,
- например, сделав рулетку, в которой  $n_i$  секторов,
- $j$ -й сектор размера  $p_{ij} \cdot 360^\circ$ .
- Перед началом очередной партии игрок крутит колесо рулетки и, после того, как оно остановится,
- номер сектора  $j$ , на который указывает стрелка рулетки, определяет стратегию, которую игрок применит в этой партии.



# Выигрыши игроков в смешанной ситуации

- В бескоалиционной игре каждый игрок использует свои чистые стратегии независимо от всех остальных игроков,
- поэтому в смешанной ситуации  $p = (p_1, \dots, p_n)$  вероятность  $p(s)$  появления (чистой) ситуации  $s = (s_1, \dots, s_n) \in S = \prod_{j=1}^n S_j$
- равна произведению вероятностей использования игроками своих чистых стратегий, т. е.

$$p(s) = p(s_1, \dots, s_n) = p_{1,s_1} \cdot p_{2,s_2} \cdot \dots \cdot p_{n,s_n}.$$

- Математическое ожидание  $\bar{\phi}_i(p)$  выигрыша игрока  $i$  ( $i = 1, \dots, n$ ) в смешанной ситуации  $p = (p_1, \dots, p_n)$  определяется по формуле

$$\begin{aligned} \bar{\phi}_i(p) &= \bar{\phi}_i(p_1, \dots, p_n) = \sum_{s \in S} \phi_i(s) p(s) \\ &= \sum_{s_1 \in S_1} \dots \sum_{s_n \in S_n} \phi_i(s_1, s_2, \dots, s_n) p_{1,s_1} \cdot \dots \cdot p_{n,s_n}. \end{aligned}$$

# Выигрыши игроков в смешанной ситуации

- В бескоалиционной игре каждый игрок использует свои чистые стратегии независимо от всех остальных игроков,
- поэтому в смешанной ситуации  $p = (p_1, \dots, p_n)$  вероятность  $p(s)$  появления (чистой) ситуации  $s = (s_1, \dots, s_n) \in S = \prod_{j=1}^n S_j$
- равна произведению вероятностей использования игроками своих чистых стратегий, т. е.

$$p(s) = p(s_1, \dots, s_n) = p_{1,s_1} \cdot p_{2,s_2} \cdot \dots \cdot p_{n,s_n}.$$

- Математическое ожидание  $\bar{\phi}_i(p)$  выигрыша игрока  $i$  ( $i = 1, \dots, n$ ) в смешанной ситуации  $p = (p_1, \dots, p_n)$  определяется по формуле

$$\begin{aligned} \bar{\phi}_i(p) &= \bar{\phi}_i(p_1, \dots, p_n) = \sum_{s \in S} \phi_i(s) p(s) \\ &= \sum_{s_1 \in S_1} \dots \sum_{s_n \in S_n} \phi_i(s_1, s_2, \dots, s_n) p_{1,s_1} \cdot \dots \cdot p_{n,s_n} \end{aligned}$$

# Выигрыши игроков в смешанной ситуации

- В бескоалиционной игре каждый игрок использует свои чистые стратегии независимо от всех остальных игроков,
- поэтому в смешанной ситуации  $p = (p_1, \dots, p_n)$  вероятность  $p(s)$  появления (чистой) ситуации  $s = (s_1, \dots, s_n) \in S = \prod_{j=1}^n S_j$
- **равна произведению вероятностей использования игроками своих чистых стратегий, т. е.**

$$p(s) = p(s_1, \dots, s_n) = p_{1,s_1} \cdot p_{2,s_2} \cdot \dots \cdot p_{n,s_n}.$$

- Математическое ожидание  $\bar{\phi}_i(p)$  выигрыша игрока  $i$  ( $i = 1, \dots, n$ ) в смешанной ситуации  $p = (p_1, \dots, p_n)$  определяется по формуле

$$\begin{aligned} \bar{\phi}_i(p) &= \bar{\phi}_i(p_1, \dots, p_n) = \sum_{s \in S} \phi_i(s) p(s) \\ &= \sum_{s_1 \in S_1} \dots \sum_{s_n \in S_n} \phi_i(s_1, s_2, \dots, s_n) p_{1,s_1} \cdot \dots \cdot p_{n,s_n} \end{aligned}$$

# Выигрыши игроков в смешанной ситуации

- В бескоалиционной игре каждый игрок использует свои чистые стратегии независимо от всех остальных игроков,
- поэтому в смешанной ситуации  $p = (p_1, \dots, p_n)$  вероятность  $p(s)$  появления (чистой) ситуации  $s = (s_1, \dots, s_n) \in S = \prod_{j=1}^n S_j$
- равна произведению вероятностей использования игроками своих чистых стратегий, т. е.

$$p(s) = p(s_1, \dots, s_n) = p_{1,s_1} \cdot p_{2,s_2} \cdot \dots \cdot p_{n,s_n}.$$

- Математическое ожидание  $\bar{\phi}_i(p)$  выигрыша игрока  $i$  ( $i = 1, \dots, n$ ) в смешанной ситуации  $p = (p_1, \dots, p_n)$  определяется по формуле

$$\begin{aligned} \bar{\phi}_i(p) &= \bar{\phi}_i(p_1, \dots, p_n) = \sum_{s \in S} \phi_i(s) p(s) \\ &= \sum_{s_1 \in S_1} \dots \sum_{s_n \in S_n} \phi_i(s_1, s_2, \dots, s_n) p_{1,s_1} \cdot \dots \cdot p_{n,s_n} \end{aligned}$$



# Выигрыши игроков в смешанной ситуации

- В бескоалиционной игре каждый игрок использует свои чистые стратегии независимо от всех остальных игроков,
- поэтому в смешанной ситуации  $p = (p_1, \dots, p_n)$  вероятность  $p(s)$  появления (чистой) ситуации  $s = (s_1, \dots, s_n) \in S = \prod_{j=1}^n S_j$
- равна произведению вероятностей использования игроками своих чистых стратегий, т. е.

$$p(s) = p(s_1, \dots, s_n) = p_{1,s_1} \cdot p_{2,s_2} \cdot \dots \cdot p_{n,s_n}.$$

- Математическое ожидание  $\bar{\phi}_i(p)$  выигрыша игрока  $i$  ( $i = 1, \dots, n$ ) в смешанной ситуации  $p = (p_1, \dots, p_n)$  определяется по формуле

$$\begin{aligned} \bar{\phi}_i(p) &= \bar{\phi}_i(p_1, \dots, p_n) = \sum_{s \in S} \phi_i(s) p(s) \\ &= \sum_{s_1 \in S_1} \dots \sum_{s_n \in S_n} \phi_i(s_1, s_2, \dots, s_n) p_{1,s_1} \dots p_{n,s_n}. \end{aligned}$$

# Выигрыши игроков в смешанной ситуации

- В бескоалиционной игре каждый игрок использует свои чистые стратегии независимо от всех остальных игроков,
- поэтому в смешанной ситуации  $p = (p_1, \dots, p_n)$  вероятность  $p(s)$  появления (чистой) ситуации  $s = (s_1, \dots, s_n) \in S = \prod_{j=1}^n S_j$
- равна произведению вероятностей использования игроками своих чистых стратегий, т. е.

$$p(s) = p(s_1, \dots, s_n) = p_{1,s_1} \cdot p_{2,s_2} \cdot \dots \cdot p_{n,s_n}.$$

- Математическое ожидание  $\bar{\phi}_i(p)$  выигрыша игрока  $i$  ( $i = 1, \dots, n$ ) в смешанной ситуации  $p = (p_1, \dots, p_n)$  определяется по формуле

$$\begin{aligned} \bar{\phi}_i(p) &= \bar{\phi}_i(p_1, \dots, p_n) = \sum_{s \in S} \phi_i(s) p(s) \\ &= \sum_{s_1 \in S_1} \dots \sum_{s_n \in S_n} \phi_i(s_1, s_2, \dots, s_n) p_{1,s_1} \dots p_{n,s_n}. \end{aligned}$$

# Смешанное расширение конечной бескоал. игры

## Определение

- Смешанным расширением конечной бескоалиционной игры  $\gamma$  называется бескоалиционная игра

$$\gamma^* = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\bar{\phi}_i\}_{i \in N}).$$

- Ситуацией равновесия (Нэша) в смешанных стратегиях игры  $\gamma$  называется ситуация равновесия ее смешанного расширения  $\gamma^*$ .

# Смешанное расширение конечной бескоал. игры

## Определение

- *Смешанным расширением* конечной бескоалиционной игры  $\gamma$  называется бескоалиционная игра

$$\gamma^* = (N, \{\mathcal{S}_i\}_{i \in N}, \{\bar{\phi}_i\}_{i \in N}).$$

- *Ситуацией равновесия (Нэша) в смешанных стратегиях* игры  $\gamma$  называется ситуация равновесия ее смешанного расширения  $\gamma^*$ .

# Смешанное расширение конечной бескоал. игры

## Определение

- Смешанным расширением конечной бескоалиционной игры  $\gamma$  называется бескоалиционная игра

$$\gamma^* = (N, \{\mathcal{S}_i\}_{i \in N}, \{\bar{\phi}_i\}_{i \in N}).$$

- Ситуацией равновесия (Нэша) в смешанных стратегиях игры  $\gamma$  называется ситуация равновесия ее смешанного расширения  $\gamma^*$ .

# Смешанные стратегии и риск

- Мы определили выигрыши игроков в смешанной ситуации равными их ожидаемым выигрышам.
- Это неявным образом предполагает, что все игроки являются нейтральными к риску.
- Для примера рассмотрим две ситуации,
  - в первой из которых игрок может выиграть с равной вероятностью 2 или 0,
  - а во второй — 1 с вероятностью 1.
- В обеих ситуациях ожидаемый выигрыш игрока равен 1.
- Для *нейтрального к риску* игрока обе ситуации равноценны,
- а *неприемлющий риск* игрок предпочтет вторую ситуацию первой.

# Смешанные стратегии и риск

- Мы определили выигрыши игроков в смешанной ситуации равными их ожидаемым выигрышам.
- Это неявным образом предполагает, что все игроки являются нейтральными к риску.
- Для примера рассмотрим две ситуации,
  - в первой из которых игрок может выиграть с равной вероятностью 2 или 0,
  - а во второй — 1 с вероятностью 1.
- В обеих ситуациях ожидаемый выигрыш игрока равен 1.
- Для *нейтрального к риску* игрока обе ситуации равноценны,
- а *неприемлющий риск* игрок предпочтет вторую ситуацию первой.

# Смешанные стратегии и риск

- Мы определили выигрыши игроков в смешанной ситуации равными их ожидаемым выигрышам.
- Это неявным образом предполагает, что все игроки являются нейтральными к риску.
- Для примера рассмотрим две ситуации,
  - в первой из которых игрок может выиграть с равной вероятностью 2 или 0,
  - а во второй — 1 с вероятностью 1.
- В обеих ситуациях ожидаемый выигрыш игрока равен 1.
- Для *нейтрального к риску* игрока обе ситуации равноценны,
- а *неприемлющий риск* игрок предпочтет вторую ситуацию первой.



# Смешанные стратегии и риск

- Мы определили выигрыши игроков в смешанной ситуации равными их ожидаемым выигрышам.
- Это неявным образом предполагает, что все игроки являются нейтральными к риску.
- Для примера рассмотрим две ситуации,
  - в первой из которых игрок может выиграть с равной вероятностью 2 или 0,
  - а во второй — 1 с вероятностью 1.
- В обеих ситуациях ожидаемый выигрыш игрока равен 1.
- Для *нейтрального к риску* игрока обе ситуации равноценны,
- а *неприемлющий риск* игрок предпочтет вторую ситуацию первой.

# Смешанные стратегии и риск

- Мы определили выигрыши игроков в смешанной ситуации равными их ожидаемым выигрышам.
- Это неявным образом предполагает, что все игроки являются нейтральными к риску.
- Для примера рассмотрим две ситуации,
  - в первой из которых игрок может выиграть с равной вероятностью 2 или 0,
  - **а во второй — 1 с вероятностью 1.**
- В обеих ситуациях ожидаемый выигрыш игрока равен 1.
- Для *нейтрального к риску* игрока обе ситуации равноценны,
- а *неприемлющий риск* игрок предпочтет вторую ситуацию первой.

# Смешанные стратегии и риск

- Мы определили выигрыши игроков в смешанной ситуации равными их ожидаемым выигрышам.
- Это неявным образом предполагает, что все игроки являются нейтральными к риску.
- Для примера рассмотрим две ситуации,
  - в первой из которых игрок может выиграть с равной вероятностью 2 или 0,
  - а во второй — 1 с вероятностью 1.
- В обеих ситуациях ожидаемый выигрыш игрока равен 1.
- Для *нейтрального к риску* игрока обе ситуации равноценны,
- а *неприемлющий риск* игрок предпочтет вторую ситуацию первой.

# Смешанные стратегии и риск

- Мы определили выигрыши игроков в смешанной ситуации равными их ожидаемым выигрышам.
- Это неявным образом предполагает, что все игроки являются нейтральными к риску.
- Для примера рассмотрим две ситуации,
  - в первой из которых игрок может выиграть с равной вероятностью 2 или 0,
  - а во второй — 1 с вероятностью 1.
- В обеих ситуациях ожидаемый выигрыш игрока равен 1.
- Для *нейтрального к риску игрока обе ситуации равноценны,*
- а *неприемлющий риск игрок* предпочтет вторую ситуацию первой.

# Смешанные стратегии и риск

- Мы определили выигрыши игроков в смешанной ситуации равными их ожидаемым выигрышам.
- Это неявным образом предполагает, что все игроки являются нейтральными к риску.
- Для примера рассмотрим две ситуации,
  - в первой из которых игрок может выиграть с равной вероятностью 2 или 0,
  - а во второй — 1 с вероятностью 1.
- В обеих ситуациях ожидаемый выигрыш игрока равен 1.
- Для *нейтрального к риску игрока* обе ситуации равноценны,
- *а неприемлющий риск игрок предпочтет вторую ситуацию первой.*

# Содержание

- 1 Бескоалиционные игры, равновесие Нэша
  - Стратегическая форма бескоалиционной игры
  - Примеры бескоалиционных игр
  - Доминирование
- 2 Выпуклые игры
  - Теорема Нэша
  - Итерационный алгоритм решения выпуклых игр
- 3 Конечные бескоалиционные игры
  - Смешанные стратегии
  - Равновесие в смешанных стратегиях

# Равновесие в смешанных стратегиях

- Рассмотрим конечную бескоалиционную игру

$$\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N})$$

- и ее смешанное расширение

$$\gamma^* = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\bar{\phi}_i\}_{i \in N}).$$

- Так как  $S_i$  есть симплекс, то  $S_i$  — выпуклое множество.
- Каждая функция  $\bar{\phi}_i$  линейна по  $p_i$  при фиксированных остальных аргументах  $p_{-i}$ .
- Поэтому  $\gamma^*$  — выпуклая игра, которая имеет ситуацию равновесия.

## Теорема (Нэша)

*Каждая конечная бескоалиционная игра имеет хотя бы одну ситуацию равновесия в смешанных стратегиях.*

# Равновесие в смешанных стратегиях

- Рассмотрим конечную бескоалиционную игру

$$\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N})$$

- и ее смешанное расширение

$$\gamma^* = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\bar{\phi}_i\}_{i \in N}).$$

- Так как  $S_i$  есть симплекс, то  $S_i$  — выпуклое множество.
- Каждая функция  $\bar{\phi}_i$  линейна по  $p_i$  при фиксированных остальных аргументах  $p_{-i}$ .
- Поэтому  $\gamma^*$  — выпуклая игра, которая имеет ситуацию равновесия.

## Теорема (Нэша)

*Каждая конечная бескоалиционная игра имеет хотя бы одну ситуацию равновесия в смешанных стратегиях.*



# Равновесие в смешанных стратегиях

- Рассмотрим конечную бескоалиционную игру

$$\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N})$$

- и ее смешанное расширение

$$\gamma^* = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\bar{\phi}_i\}_{i \in N}).$$

- Так как  $S_i$  есть симплекс, то  $S_i$  — выпуклое множество.
- Каждая функция  $\bar{\phi}_i$  линейна по  $p_i$  при фиксированных остальных аргументах  $p_{-i}$ .
- Поэтому  $\gamma^*$  — выпуклая игра, которая имеет ситуацию равновесия.

## Теорема (Нэша)

*Каждая конечная бескоалиционная игра имеет хотя бы одну ситуацию равновесия в смешанных стратегиях.*

# Равновесие в смешанных стратегиях

- Рассмотрим конечную бескоалиционную игру

$$\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N})$$

- и ее смешанное расширение

$$\gamma^* = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\bar{\phi}_i\}_{i \in N}).$$

- Так как  $S_i$  есть симплекс, то  $S_i$  — выпуклое множество.
- Каждая функция  $\bar{\phi}_i$  линейна по  $p_i$  при фиксированных остальных аргументах  $p_{-i}$ .
- Поэтому  $\gamma^*$  — выпуклая игра, которая имеет ситуацию равновесия.

## Теорема (Нэша)

*Каждая конечная бескоалиционная игра имеет хотя бы одну ситуацию равновесия в смешанных стратегиях.*

# Равновесие в смешанных стратегиях

- Рассмотрим конечную бескоалиционную игру

$$\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N})$$

- и ее смешанное расширение

$$\gamma^* = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\bar{\phi}_i\}_{i \in N}).$$

- Так как  $S_i$  есть симплекс, то  $S_i$  — выпуклое множество.
- Каждая функция  $\bar{\phi}_i$  линейна по  $p_i$  при фиксированных остальных аргументах  $p_{-i}$ .
- Поэтому  $\gamma^*$  — выпуклая игра, которая имеет ситуацию равновесия.

## Теорема (Нэша)

*Каждая конечная бескоалиционная игра имеет хотя бы одну ситуацию равновесия в смешанных стратегиях.*

# Равновесие в смешанных стратегиях

- Рассмотрим конечную бескоалиционную игру

$$\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N})$$

- и ее смешанное расширение

$$\gamma^* = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\bar{\phi}_i\}_{i \in N}).$$

- Так как  $S_i$  есть симплекс, то  $S_i$  — выпуклое множество.
- Каждая функция  $\bar{\phi}_i$  линейна по  $p_i$  при фиксированных остальных аргументах  $p_{-i}$ .
- Поэтому  $\gamma^*$  — выпуклая игра, которая имеет ситуацию равновесия.

## Теорема (Нэша)

*Каждая конечная бескоалиционная игра имеет хотя бы одну ситуацию равновесия в смешанных стратегиях.*

# Является ли смешанная ситуация равновесием

## Теорема

*Чтобы смешанная ситуация  $p \in \mathcal{S} = \mathcal{S}_1 \times \dots \times \mathcal{S}_n$  была ситуацией равновесия в смешанных стратегиях в конечной бескоалиционной игре  $\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N})$ , необходимо и достаточно, чтобы выполнялись неравенства:*

$$\bar{\phi}_i(p) \geq \bar{\phi}_i(e_j, p_{-i}), \quad e_j \in \Sigma_{n_i}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Эта теорема утверждает, что

*ситуация является равновесием в смешанных стратегиях, если ни одному игроку в отдельности не выгодно переходить от своей смешанной стратегии к какой-либо чистой стратегии.*

# Является ли смешанная ситуация равновесием

## Теорема

Чтобы смешанная ситуация  $p \in \mathcal{S} = \mathcal{S}_1 \times \dots \times \mathcal{S}_n$  была ситуацией равновесия в смешанных стратегиях в конечной бескоалиционной игре  $\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N})$ , *необходимо и достаточно, чтобы выполнялись неравенства:*

$$\bar{\phi}_i(p) \geq \bar{\phi}_i(e_j, p_{-i}), \quad e_j \in \Sigma_{n_i}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Эта теорема утверждает, что

*ситуация является равновесием в смешанных стратегиях, если ни одному игроку в отдельности не выгодно переходить от своей смешанной стратегии к какой-либо чистой стратегии.*

# Является ли смешанная ситуация равновесием

## Теорема

Чтобы смешанная ситуация  $p \in \mathcal{S} = \mathcal{S}_1 \times \dots \times \mathcal{S}_n$  была ситуацией равновесия в смешанных стратегиях в конечной бескоалиционной игре  $\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N})$ , необходимо и достаточно, чтобы выполнялись неравенства:

$$\bar{\phi}_i(p) \geq \bar{\phi}_i(e_j, p_{-i}), \quad e_j \in \Sigma_{n_i}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Эта теорема утверждает, что

*ситуация является равновесием в смешанных стратегиях, если ни одному игроку в отдельности не выгодно переходить от своей смешанной стратегии к какой-либо чистой стратегии.*

# Является ли смешанная ситуация равновесием

## Теорема

Чтобы смешанная ситуация  $p \in \mathcal{S} = \mathcal{S}_1 \times \dots \times \mathcal{S}_n$  была ситуацией равновесия в смешанных стратегиях в конечной бескоалиционной игре  $\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N})$ , необходимо и достаточно, чтобы выполнялись неравенства:

$$\bar{\phi}_i(p) \geq \bar{\phi}_i(e_j, p_{-i}), \quad e_j \in \Sigma_{n_i}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Эта теорема утверждает, что

*ситуация является равновесием в смешанных стратегиях, если ни одному игроку в отдельности не выгодно переходить от своей смешанной стратегии к какой-либо чистой стратегии.*



# Является ли смешанная ситуация равновесием

## Доказательство.

- По определению  $p$  есть ситуация равновесия игры  $\gamma^*$  (смешанного расширения игры  $\gamma$ ), если выполняются неравенства

$$\bar{\phi}_i(p) \geq \bar{\phi}_i(\bar{p}^i, p_{-i}), \quad \bar{p}^i \in \Sigma_{n_i}, \quad i = 1, \dots, n. \quad (*)$$

- Поскольку  $\bar{p}^i = \bar{p}_1^i e_1 + \bar{p}_2^i e_2 + \dots + \bar{p}_{n_i}^i e_{n_i}$ ,
- то, сложив неравенства

$$\bar{p}_j^i \cdot \bar{\phi}_i(p) \geq \bar{p}_j^i \cdot \bar{\phi}_i(e_j, p_{-i}), \quad e_j \in \Sigma_{n_i},$$

- получим неравенство

$$\bar{\phi}_i(p) \geq \bar{\phi}_i(\bar{p}^i, p_{-i}).$$

- Следовательно, система (\*) есть следствие системы

$$\bar{\phi}_i(p) \geq \bar{\phi}_i(e_j, p_{-i}), \quad e_j \in \Sigma_{n_i}, \quad i = 1, \dots, n.$$



# Является ли смешанная ситуация равновесием

## Доказательство.

- По определению  $p$  есть ситуация равновесия игры  $\gamma^*$  (смешанного расширения игры  $\gamma$ ), если выполняются неравенства

$$\bar{\phi}_i(p) \geq \bar{\phi}_i(\bar{p}^i, p_{-i}), \quad \bar{p}^i \in \Sigma_{n_i}, \quad i = 1, \dots, n. \quad (*)$$

- Поскольку  $\bar{p}^i = \bar{p}_1^i e_1 + \bar{p}_2^i e_2 + \dots + \bar{p}_{n_i}^i e_{n_i}$ ,

- то, сложив неравенства

$$\bar{p}_j^i \cdot \bar{\phi}_i(p) \geq \bar{p}_j^i \cdot \bar{\phi}_i(e_j, p_{-i}), \quad e_j \in \Sigma_{n_i},$$

- получим неравенство

$$\bar{\phi}_i(p) \geq \bar{\phi}_i(\bar{p}^i, p_{-i}).$$

- Следовательно, система (\*) есть следствие системы

$$\bar{\phi}_i(p) \geq \bar{\phi}_i(e_j, p_{-i}), \quad e_j \in \Sigma_{n_i}, \quad i = 1, \dots, n.$$



# Является ли смешанная ситуация равновесием

## Доказательство.

- По определению  $p$  есть ситуация равновесия игры  $\gamma^*$  (смешанного расширения игры  $\gamma$ ), если выполняются неравенства

$$\bar{\phi}_i(p) \geq \bar{\phi}_i(\bar{p}^i, p_{-i}), \quad \bar{p}^i \in \Sigma_{n_i}, \quad i = 1, \dots, n. \quad (*)$$

- Поскольку  $\bar{p}^i = \bar{p}_1^i e_1 + \bar{p}_2^i e_2 + \dots + \bar{p}_{n_i}^i e_{n_i}$ ,

- то, сложив неравенства

$$\bar{p}_j^i \cdot \bar{\phi}_i(p) \geq \bar{p}_j^i \cdot \bar{\phi}_i(e_j, p_{-i}), \quad e_j \in \Sigma_{n_i},$$

- получим неравенство

$$\bar{\phi}_i(p) \geq \bar{\phi}_i(\bar{p}^i, p_{-i}).$$

- Следовательно, система (\*) есть следствие системы

$$\bar{\phi}_i(p) \geq \bar{\phi}_i(e_j, p_{-i}), \quad e_j \in \Sigma_{n_i}, \quad i = 1, \dots, n.$$



# Является ли смешанная ситуация равновесием

## Доказательство.

- По определению  $p$  есть ситуация равновесия игры  $\gamma^*$  (смешанного расширения игры  $\gamma$ ), если выполняются неравенства

$$\bar{\phi}_i(p) \geq \bar{\phi}_i(\bar{p}^i, p_{-i}), \quad \bar{p}^i \in \Sigma_{n_i}, \quad i = 1, \dots, n. \quad (*)$$

- Поскольку  $\bar{p}^i = \bar{p}_1^i e_1 + \bar{p}_2^i e_2 + \dots + \bar{p}_{n_i}^i e_{n_i}$ ,
- то, сложив неравенства

$$\bar{p}_j^i \cdot \bar{\phi}_i(p) \geq \bar{p}_j^i \cdot \bar{\phi}_i(e_j, p_{-i}), \quad e_j \in \Sigma_{n_i},$$

- получим неравенство

$$\bar{\phi}_i(p) \geq \bar{\phi}_i(\bar{p}^i, p_{-i}).$$

- Следовательно, система (\*) есть следствие системы

$$\bar{\phi}_i(p) \geq \bar{\phi}_i(e_j, p_{-i}), \quad e_j \in \Sigma_{n_i}, \quad i = 1, \dots, n.$$



# Является ли смешанная ситуация равновесием

## Доказательство.

- По определению  $p$  есть ситуация равновесия игры  $\gamma^*$  (смешанного расширения игры  $\gamma$ ), если выполняются неравенства

$$\bar{\phi}_i(p) \geq \bar{\phi}_i(\bar{p}^i, p_{-i}), \quad \bar{p}^i \in \Sigma_{n_i}, \quad i = 1, \dots, n. \quad (*)$$

- Поскольку  $\bar{p}^i = \bar{p}_1^i e_1 + \bar{p}_2^i e_2 + \dots + \bar{p}_{n_i}^i e_{n_i}$ ,
- то, сложив неравенства

$$\bar{p}_j^i \cdot \bar{\phi}_i(p) \geq \bar{p}_j^i \cdot \bar{\phi}_i(e_j, p_{-i}), \quad e_j \in \Sigma_{n_i},$$

- получим неравенство

$$\bar{\phi}_i(p) \geq \bar{\phi}_i(\bar{p}^i, p_{-i}).$$

- Следовательно, система (\*) есть следствие системы

$$\bar{\phi}_i(p) \geq \bar{\phi}_i(e_j, p_{-i}), \quad e_j \in \Sigma_{n_i}, \quad i = 1, \dots, n.$$



# Теорема Нэша

## Доказательство.

- Пусть  $\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N})$  есть выпуклая игра.
- Определим многозначное отображение  $Z : S \rightarrow S$  по правилу:  $Z(s) = Z_1(s) \times Z_2(s) \times \dots \times Z_n(s)$ , где
$$Z_i(s) = \arg \max_{\bar{s}_i \in S_i} \phi(\bar{s}_i, s_{-i}), \quad i = 1, \dots, n.$$
- Любая стратегия  $\bar{s}_i \in Z_i(s)$  игрока  $i$  является его оптим. ответом на набор стратегий оппонентов  $s_{-i}$ .
- Поэтому неподвижные точки  $s^* \in Z(s^*)$  отображения  $Z$  являются ситуациями равновесия в игре  $\gamma$ .
- Так как  $Z$  является  $K$ -отображением, то по теореме Какутани оно имеет неподвижную точку.



◀ Вернуться к формулировке

# Теорема Нэша

## Доказательство.

- Пусть  $\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N})$  есть выпуклая игра.
- Определим многозначное отображение  $Z : S \rightarrow S$  по правилу:  $Z(s) = Z_1(s) \times Z_2(s) \times \cdots \times Z_n(s)$ , где
$$Z_i(s) = \arg \max_{\bar{s}_i \in S_i} \phi(\bar{s}_i, s_{-i}), \quad i = 1, \dots, n.$$
- Любая стратегия  $\bar{s}_i \in Z_i(s)$  игрока  $i$  является его оптим. ответом на набор стратегий оппонентов  $s_{-i}$ .
- Поэтому неподвижные точки  $s^* \in Z(s^*)$  отображения  $Z$  являются ситуациями равновесия в игре  $\gamma$ .
- Так как  $Z$  является  $K$ -отображением, то по теореме Какутани оно имеет неподвижную точку.



◀ Вернуться к формулировке

# Теорема Нэша

## Доказательство.

- Пусть  $\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N})$  есть выпуклая игра.
- Определим многозначное отображение  $Z : S \rightarrow S$  по правилу:  $Z(s) = Z_1(s) \times Z_2(s) \times \dots \times Z_n(s)$ , где
$$Z_i(s) = \arg \max_{\bar{s}_i \in S_i} \phi(\bar{s}_i, s_{-i}), \quad i = 1, \dots, n.$$
- Любая стратегия  $\bar{s}_i \in Z_i(s)$  игрока  $i$  является его оптим. ответом на набор стратегий оппонентов  $s_{-i}$ .
- Поэтому неподвижные точки  $s^* \in Z(s^*)$  отображения  $Z$  являются ситуациями равновесия в игре  $\gamma$ .
- Так как  $Z$  является  $K$ -отображением, то по теореме Какутани оно имеет неподвижную точку.



◀ Вернуться к формулировке



# Теорема Нэша

## Доказательство.

- Пусть  $\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N})$  есть выпуклая игра.
- Определим многозначное отображение  $Z : S \rightarrow S$  по правилу:  $Z(s) = Z_1(s) \times Z_2(s) \times \cdots \times Z_n(s)$ , где
$$Z_i(s) = \arg \max_{\bar{s}_i \in S_i} \phi(\bar{s}_i, s_{-i}), \quad i = 1, \dots, n.$$
- Любая стратегия  $\bar{s}_i \in Z_i(s)$  игрока  $i$  является его оптим. ответом на набор стратегий оппонентов  $s_{-i}$ .
- Поэтому неподвижные точки  $s^* \in Z(s^*)$  отображения  $Z$  являются ситуациями равновесия в игре  $\gamma$ .
- Так как  $Z$  является  $K$ -отображением, то по теореме Какутани оно имеет неподвижную точку.



◀ Вернуться к формулировке

# Теорема Нэша

## Доказательство.

- Пусть  $\gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{\phi_i\}_{i \in N})$  есть выпуклая игра.
- Определим многозначное отображение  $Z : S \rightarrow S$  по правилу:  $Z(s) = Z_1(s) \times Z_2(s) \times \dots \times Z_n(s)$ , где
$$Z_i(s) = \arg \max_{\bar{s}_i \in S_i} \phi(\bar{s}_i, s_{-i}), \quad i = 1, \dots, n.$$
- Любая стратегия  $\bar{s}_i \in Z_i(s)$  игрока  $i$  является его оптим. ответом на набор стратегий оппонентов  $s_{-i}$ .
- Поэтому неподвижные точки  $s^* \in Z(s^*)$  отображения  $Z$  являются ситуациями равновесия в игре  $\gamma$ .
- Так как  $Z$  является  $K$ -отображением, то по теореме Какутани оно имеет неподвижную точку.



◀ Вернуться к формулировке